

# ホクコーオリゼメート<sup>®</sup>粒剤20

■種類名：プロベナゾール粒剤  
■有効成分：プロベナゾール-----20.0%

■登録番号：第16019号  
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
■登録初年：1985.02.21  
■性状：淡褐色細粒  
■有効年限：4年  
■包装：20kg×1袋

## 【特長】

- 本田オリゼメートの空中散布専用剤。
- 無人ヘリにも適用のある取り扱いやすい粒剤タイプの薬剤。

## 【適用内容】(2014年10月末日現在)

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1kg /10a	収穫14日前まで	2回以内	空中散布	2回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内)
					無人ヘリコプターによる散布	

## 【効果・薬害等の注意】

- 本剤は空中散布専用剤としてヘリコプター用又は無人ヘリコプター用粒剤散布装置によって散布する。
- 本剤は湛水状態(湛水深3～5cm)でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らせたりしないように注意し、また散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 砂質土など漏水の多い水田での使用はさけること。
- 散布薬剤の飛散によって他の動植物等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意すること。
- 散布終了後は次の項目を守ること。
  - ◆ 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に適切に処理すること。
  - ◆ 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- 本剤は予防的に散布した場合に有効である。葉いもち防除の使用適期日は、初発の7～10日前であるので、発生予察情報に注意して時期を失ないように散布すること。穂いもち防除の使用適期は、出穂の3～4週間前である。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないように注意すること。
- ❖ 散布中や薬剤または散布装置の取扱いには農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。  
空中散布または無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意すること。  
散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。