

カセット[®]水和剤

■種類名：オキシリニック酸・カスガマイシン水和剤
 ■有効成分：オキシリニック酸-----10.0%
 カスガマイシン塩酸塩-----2.9%
 [カスガマイシンとして]-----2.5%]

■登録番号：第18409号
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 ■登録初年：1993.08.27
 ■性状：類白色水和性粉末 45μm以下
 ■有効年限：4年
 ■包装：500g×20袋

【特長】

- 細菌性病害に卓効を示すスターナと細菌性病害に治療効果のあるカスミンとの混合剤。
- 作用性の異なる細菌病害防除剤の配合により、有効成分が相乗的に作用し、細菌性病害に対して安定した効果を発揮する。
- 病原菌の感染前から感染初期に散布しても効果を発揮する散布適期幅が比較的広い。
- 銅剤の使用できない作物や幼苗期などで使用する場合に効果的である。

【適用内容】(2014年10月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	軟腐病	1000	100~300 % ₁₀ a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内 (種いも浸漬は1回以内)	4回以内 (種いも浸漬は1回以内、 植付後は3回以内)
	そうか病	30	—	植付前	1回	種いも瞬間浸漬		
キャベツ	軟腐病 黒腐病 黒斑細菌病	1000	100~300 % ₁₀ a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
ブロッコリー	黒腐病			収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
はくさい	軟腐病 黒斑細菌病			収穫14日前まで	3回以内		3回以内	
だいこん				収穫14日前まで	5回以内		5回以内	
たまねぎ	軟腐病			収穫7日前まで	2回以内		2回以内	
レタス	軟腐病 腐敗病 斑点細菌病			2回以内	4回以内			
にんにく	春腐病			5回以内				

【効果・葉害等の注意】

- れんこんには葉害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- キャベツの軟腐病及び黒腐病に使用する場合、多発条件下では効果が劣る場合があるので注意すること。
- ばれいしょの種いも浸漬に使用する場合、葉害が生ずるおそれがあるので、萌芽後や種いも切断後の使用は避けること。なお、本剤の処理により、軽度の萌芽遅延を認めることがあるが、その後の生育には影響はみられない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 使用の際は不浸透性手袋などを着用すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管すること。