

# ホクコールーバンリンバー粒剤

■種類名：ベンスルタップ・フラメトピル粒剤

■有効成分：ベンスルタップ-----4.0%  
フラメトピル-----1.5%

■登録番号：第20484号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2000.11.29

■性状：類白色細粒

■有効年限：3年

■包装：3kg×8袋

## 【特長】

- 紋枯病防除剤リンバーに殺虫剤ルーバンを混合した粒剤。
- 紋枯病、コブノメイガ、ニカメイチュウに適用がある。

## 【適用内容】(2014年10月末日現在)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンスルタップを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病 コブノメイガ ニカメイチュウ	3kg/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内)	2回以内 (育苗箱散布は1回以内)

## 【効果・薬害等の注意】

- 散布にあたっては湛水状態(水深3cm以上)で播きむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用を避けること。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにすること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。  
水産動植物(甲殻類、藻類、ドジョウ)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。  
散布後は水管理に注意すること。  
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。