

ホクコースタークルリンバー粒剤

■種類名：ジノテフラン・フラメトピル粒剤
 ■有効成分：ジノテフラン-----1.67%
 フラメトピル-----1.5%

■登録番号：第22313号
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 ■登録初年：2009.01.21
 ■性状：類白色細粒
 ■有効年限：3年
 ■包装：3kg×8袋

【特長】

- 本田でのいもち病防除が不要な地域に適合した紋枯病・害虫本田防除剤。
- 紋枯病防除時期の処理で斑点米カメムシ類まで同時防除でき、省力化に貢献できる。
- 飛散の少ない粒剤タイプ。

【適用内容】(2015年10月末日現在)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3kg/10a	収穫30日 前まで	1回	散布	4回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、空中 散布、無人ヘリ散布は 合計3回以内)	2回以内 (育苗箱散布は 1回以内)

【効果・薬害等の注意】

- 散布に当たっては、湛水状態(水深3～5cm)で重複をさけ均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水及びかけ流しをしないこと。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用を避けること。
- 本剤を散布した水田の田面水を他作物の灌水に用いないこと。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないこと。
 - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 散布に使用した器具、容器の洗浄水及び空袋等は河川等に流さず、容器、空袋は環境に影響を与えないように適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。