

ホクコーラブサイドスタークルフロアブル

■種類名：ジノテフラン・フサライド水和剤
 ■有効成分：ジノテフラン-----5.0%
 フサライド-----12.0%
 ■PRTR法指定物質：フサライド【第1種】-----12.0%

■登録番号：第21710号
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 ■登録初年：2006.06.07
 ■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
 ■有効年限：4年
 ■包装：1ℓ×12本、20ℓ×1缶(2年)

【特長】

➢ いもち病防除剤ラブサイドとカメムシ類等に効果の高いスタークルとの混合剤。

【適用内容】(2015年10月末日現在)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ウンカ類	原液	0.2ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	空中散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	3回以内
		4倍	0.8ℓ /10a			無人ヘリコプターによる散布		
	いもち病 カメムシ類	150倍	25ℓ /10a			散布		
	いもち病 カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	500倍	60~ 150ℓ /10a					

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 使用に際しては、容器をよく振ること。
- 使用量にあわせ薬液を調製し、使いきること。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し適切に処理すること。洗浄液は薬液タンクに入れること。
- 本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ること。
 - ◆ 各散布機種の散布基準に従って実施すること。
 - ◆ 微量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。
 - ◆ 無人ヘリコプターによる散布にあつては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ◆ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ◆ 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ◆ 散布終了後は次の事項を守ること。
 - ① 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に適切に処理すること。
 - ② 機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
 - ◆ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意すること。
- 本剤を水田の水稻に対して希釈倍率 150 倍で使用する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないこと。
 - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受けること。使用後は洗眼すること。
- ❖ 無人ヘリコプターによる散布の際は農薬用マスクを着用すること。散布後はうがいをすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。