

サムコル®フロアブル10

■種類名：クロラントラニプロール水和剤
 ■有効成分：クロラントラニプロール..... 10.0%

■登録番号：第22469号（デュポン登録）
 ■毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
 ■登録初年：2009.09.28
 ■性状：淡褐色水和性粘稠懸濁液体
 ■有効年限：4年
 ■包装：200ml×40本、500ml×20本
 1ℓ×12本

サムコル®は米国デュポン社の登録商標です。

【特長】

- 新規成分クロラントラニプロール含有の果樹・茶用の殺虫剤。
- チョウ目害虫に高い効果を発揮する。
- 速やかに害虫の摂食活動を停止させ、長い残効性を示す（約2週間効果が期待できる）。
- 適用作物に対する安全性が高い。

【適用内容】（2015年10月末日現在）

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ、ヨモギエダシヤク	2000	200~400	摘採 3日前まで	1回		1回
	チャノホソガ	2000~4000					
	ハスモンヨトウ	4000					
りんご	シンクイムシ類、ハマキムシ類 キンモンホソガ、ヒメボクトウ ギンモンハモグリガ、ケムシ類	2500~5000	200~700	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ヨモギエダシヤク						
ぶどう	ハマキムシ類 モンキクロノメイガ、ケムシ類	5000					
おうとう	ケムシ類、ハマキムシ類	2500~5000					
	オウトウショウジョウバエ	2500					
うめ	ハマキムシ類	2500~5000					
	ケムシ類						
すもも	シンクイムシ類	2500					
	ケムシ類、ハマキムシ類	2500~5000					
あんず		2500					
なし	ケムシ類、シンクイムシ類	2500~5000					
	ハマキムシ類、ヒメボクトウ						
もも	シンクイムシ類、モモハモグリガ	5000	収穫 前日まで	2回以内	2回以内		
ネクタリン	ハマキムシ類						
かき	ヒロヘリアオイラガ カキノヘタムシガ、ハマキムシ類 ケムシ類、ハスモンヨトウ	5000	100~300	収穫 前日まで	3回以内	3回以内	
さとうきび	イネヨトウ						収穫 30日前まで

【効果・薬害等の注意】

- 使用前によく振ってから使用すること。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節すること。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理すること。洗浄水はタンクに入れること。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲などのないように注意すること。
- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきることを。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。