

# ワイドショット® 1キロ粒剤

■種類名：テフリルトリオン・ペノキスラム粒剤  
 ■有効成分：テフリルトリオン-----3.0%  
                   ペノキスラム-----0.50%

■登録番号：第23579号  
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
 ■登録初年：2014.10.22  
 ■性状：淡褐色細粒  
 ■有効年限：3年  
 ■包装：1kg×12袋、10kg×1袋

## 【特長】

- 移植後15日～ノビエ4葉期まで使用できる中・後期除草剤。
- 湛水散布が可能。
- SU抵抗性雑草、多年生雑草に有効。

## 【適用内容】(2015年5月27日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数	ペノキスラムを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(東北) ミズガヤツリ ウリカワ オモダカ(東北、九州を除く) クログワイ(北陸、近畿・中国・四国) ヒルムシロ セリ(東北、北陸を除く)	移植後15日～ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	砂壤土～ 埴土	1kg /10a	1回	湛水散布	北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内
			壤土～ 埴土				東北、九州の普通期及び早期栽培地帯		

## 【効果・薬害等の注意】

- 本剤は、ノビエの4葉期までに時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは4葉期まで(ホタルイ、ミズガヤツリの東北は3葉期まで、ウリカワの東北、関東・東山・東海は3葉期まで)、オモダカは草丈30cm以下、クログワイは草丈20cm以下、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期までが本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイの防除は、必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせて使用すること。
- 苗の植え付けが均一となるように代かきを丁寧に行うこと。未熟有機物を使用した場合は、特に丁寧に行うこと。
- 散布に当たっては水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。自然減水により田面の一部が露出する間際になったら、水尻は止めたままにし、通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じること。
- 散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用を避けること。
- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように適期に散布すること。
- 下記のような条件では薬害を生じやすいので使用を避けること。特にこれらの悪条件が重なる場合は使用しないこと。
  - ◆ 処理後数日、異常高温が続くことが予想される場合。
  - ◆ 苗が軟弱な場合や活着不良の時、又は極端な深植えの場合。
  - ◆ 砂質土壌の水田、減水深の大きな水田(減水深2cm/日以上)。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意すること。
- 散布田の水田水を他の作物に灌水しないこと。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。