

お客様各位

2017年8月31日
北興化学工業株式会社

適用拡大のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2017年8月30日付で下記農薬の適用が拡大登録されましたので、お知らせ致します。

記

以上

農薬名

第10529号 ホクコーオーソサイド水和剤80

適用拡大の内容

- ①しょうがの適用病害虫名「根茎腐敗病」に使用方法「灌注」を追加する。
- ②しょうがの適用病害虫名に「白星病」を追加する。
- ③ブルーベリーのキャプタンを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「5回以内（生育期は2回以内、収穫終了後～落葉期は3回以内）」に変更する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
ブルーベリー	斑点病	500～1000倍	200～700 ℓ /10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	5回以内 (生育期は2回以内、 収穫終了後～ 落葉期は3回以内)
	すす点病 灰色かび病	500倍					
しょうが	白星病	600倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は、2回以内)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
しょうが	根茎腐敗病	塊茎重量の2%	—	植付前	1回	塊茎粉衣	5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は、2回以内)
		400倍	3L/m ²	収穫30日前まで	2回以内	灌注	

使用上の注意事項 (変更部分)

【変更前】

- (14) 本剤で処理した種しょうがは食料や動物飼料として用いないこと。
また、収穫時には新しょうがと処理した種しょうがを分別し、種しょうがは食料や動物飼料として用いないこと。

【変更後】

- (14) 本剤で塊茎粉衣処理した種しょうがは食料や動物飼料として用いないこと。
また、収穫時には新しょうがと塊茎粉衣処理した種しょうがを分別し、塊茎粉衣処理した種しょうがは確実に廃棄すること。

適用拡大後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上