

お客様各位

2024 年 3 月 13 日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2024 年 3 月 13 日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第 1 1 5 7 5 号 ホクコー トップジン M 水和剤

適用内容の追加・変更

- ・作物名「つつじ類」、「かし」、「さくら」、「じんちょうげ」、「ぼけ」、「ポプラ」及び「いぬつげ」を削除し、作物名「樹木類（つつじ類、かし、さくら、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげを除く）」を「樹木類」に変更する。
- ・作物名「みかん」及び「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（黒斑病）」を追加する。
- ・作物名「小粒核果類」に適用病害虫名「すす斑病（うめ）」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「根朽病」を追加する。
- ・作物名「メロン」に適用病害虫名「菌核病」を追加する。
- ・作物名「ピーマン」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」について次のとおり変更する。
 - ①使用方法「散布」に適用病害虫名「萎凋病」、「黒腐菌核病」及び「小菌核病」を追加する。
 - ②使用方法「苗床灌注」に適用病害虫名「萎凋病」及び「黒腐菌核病」を追加する。
- ・作物名「樹木類」に適用病害虫名「褐斑病（つつじ類）」、「幼果菌核病（さくら）」、「紫かび病（かし）」、「黒点病（じんちょうげ）」、「褐斑病（ぼけ）」、「マルヅニナ落葉病（ポプラ）」、「枝枯病（いぬつげ）」及び「赤枯病（すぎ）」を追加する。
- ・作物名「くり」の希釈倍数「1000 倍」を「1000～1500 倍」に変更する。

（次のページに続く）

【変更後】（追加・変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数	
みかん	そうか病	30 倍	8L/10a	4～ 6 月	5 回 以内	空中 散布	8 回以内 (塗布は 3 回 以内、散布、 空中散布及び 無人航空機 散布は合計 5 回以内)	
	灰色かび病	1000～	200～ 700L /10a	収穫 前日 まで				
	そうか病	1500 倍						
	貯蔵病害(黒斑病)	2000 倍						
貯蔵病害(軸腐病)	2000～							
かんきつ (みかん を除く)	貯蔵病害(青かび病)	3000 倍					8 回以内 (塗布は 3 回 以内、散布及び 無人航空機散布 は合計 5 回以内)	
	貯蔵病害(緑かび病)							
	貯蔵病害(黒斑病)	2000 倍						すももは 6 回以内 (塗布は 3 回 以内、休眠期 の散布は 1 回 以内、生育期 の散布は 3 回 以内)、 その他の 小粒核果類は 6 回以内(塗布 は 3 回以内、 散布は 3 回 以内)
	すず斑病 (うめ)	1000 倍						
小粒 核果類	灰星病 環紋葉枯病 葉炭疽病 黒星病 黒粒枝枯病	1000～ 1500 倍		収穫 21 日 前まで	3 回 以内	散布		
くり	実炭疽病	1000～ 1500 倍		収穫 3 日前 まで	4 回 以内			7 回以内 (散布は 4 回以内、 塗布は 3 回 以内)
ブロッコリー	菌核病 根朽病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内		3 回以内 (種子への処理 は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)	
メロン	つる枯病 陥没病 菌核病	1500～ 2000 倍		収穫 前日 まで	3 回 以内		5 回以内 (種子への処理 は 1 回以内、 塗布は 1 回 以内、散布は 3 回以内)	

（次のページに続く）

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
ピーマン	黒枯病 <u>炭疽病</u>	4000～ 6000 倍	100～ 300L/10a	収穫 前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (種子への処理 は 1 回以内、 は種後は 3 回以内)
ねぎ	<u>萎凋病</u> <u>黒腐菌核病</u> <u>小菌核病</u> 小菌核腐敗病	1000 倍		収穫 7 日前 まで	3 回 以内		5 回以内 (種子への処理 は 1 回以内、 苗根部浸漬及び 苗床灌注は 合計 1 回以内、 散布及び 株元散布は 合計 3 回以内)
	<u>萎凋病</u> <u>黒腐菌核病</u> 小菌核腐敗病	250 倍	チェーンホット 1 冊 (30×60cm、 土壌量約 5L) 当り 0.5～1L	定植 直前	1 回	苗床 灌注	
	<u>萎凋病</u> 小菌核腐敗病	20 倍	—			3 分間 苗根部 浸漬	
		200 倍				30 分間 苗根部 浸漬	
樹木類	炭疽病	1000～ 2000 倍	200～ 700L /10a	発病 初期	5 回 以内	散布	5 回以内
	<u>褐斑病(つつじ類)</u> <u>幼果菌核病(さくら)</u>	1000～ 1500 倍					
	うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症(シュートサークスボラ菌) <u>紫かび病(かし)</u> <u>黒点病(じんちょうげ)</u> <u>褐斑病(ぼけ)</u> <u>マルゾニナ落葉病(ホブウ)</u> <u>枝枯病(いぬつげ)</u> <u>赤枯病(すぎ)</u>	1000 倍					

注意事項の変更 (変更された内容のみ抜粋)

(使用上の注意事項)

- ・かんきつの貯蔵病害防除に使用する場合には、収穫前 3 週間以内〔かんきつ(みかんを除く)の場合には収穫前 2～3 週間の間〕に 1 回散布すると効果的である。

製品情報の詳細は、[こちら\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照ください。

以上