

登録内容変更についてのお願い

ホクコー オルトラン® 粒 剤 (農林水産省登録第 13177号)

ホクコー オルトラン® 水和剤 (農林水産省登録第 13175号)

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から急性暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、オルトラン粒剤・水和剤は自主的に登録縮小の申請を致しました。これは、現在登録されている使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。

このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録予定内容にてご使用いただけますようお願いいたします。

◆農薬登録の削除作物について

下記、登録削除作物でのオルトラン剤の使用をしないようお願いします。

オルトラン粒剤	作物名	登録削除の内容
	ミニトマト	作物を削除
	はつかだいこん	

オルトラン水和剤	作物名	登録削除の内容
	かんきつ	作物を削除
	トマト	
	ミニトマト	
	ブロッコリー	
	なす	
	だいこん	
	かぶ	
	はつかだいこん	

その他、「たかな」が非結球あぶらな科葉菜類から作物削除、「とうもろこし」が「未成熟とうもろこし」に変更されます。

◆使用方法の変更作物について

オルトラン剤は表①および表②の農薬登録申請内容のとおり、農薬登録の縮小申請をしました。今後は、表①および表②のとおり農薬登録されている使用方法の変更申請内容においてご使用願います。但し、申請内容は今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

表① オルトラン粒剤

平成26年7月1日 使用方法変更 申請内容 (赤字部分)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1回	散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	作条散布 又は 植穴処理	1回
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ				株元散布	
ピーマン	アブラムシ類	2g/株			植穴処理	
はくさい	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)			作条散布	
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類	3~4kg/10a	は種前	1回	株元散布	1回
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫21日前まで		株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
ごぼう	アブラムシ類	3~6kg/10a	収穫75日前まで	1回	株元散布	2回以内
れんこん		4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布 無人ヘリコプター 散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)
ばれいしょ	アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	植付時	1回	作条散布	3回以内
えだまめ	ハスモントウ	3~6kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	生育期株元散布	1回
なばな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	5回以内
			は種時		播溝土壌混和	
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類 アブラムシ類 ヨトウムシ類	3~6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
宿根スターチス	コガネムシ類幼虫	6kg/10a				
カーネーション	コナガ					
アリウム	ネギコガ					
きく	ネキリムシ類 ハモグリバエ類					
たであい	アブラムシ類	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約1.5~4L) 当り50g	定植時	1回	本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポットの 上から均一に 散布する。	1回
		6kg/10a			株元散布	
いぐさ	イグサシジミガ	4kg/10a	生育期	2回以内	湛水散布	2回以内
芝	スジキリトウ シバツグ	10kg/10a	発生初期	5回以内	全面散布	5回以内
	タマネギ	5~10kg/10a				
たばこ	ヨトウムシ、ネキリムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ジャガイモガ ヤサイノウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a	移植前	1回	作条に散布し 土壌混和	2回以内
			本畑初期		株元散布	



表② オルトラン水和剤 平成26年7月1日 使用方法変更 申請内容 (赤字部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨウムシ、ハスモンヨウ タナキンウバ	1000~1500	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後は1回以内)		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000~2000				1回		
はくさい	カブラハバチ、ヨウムシ ハスモンヨウ	1500		3回以内		3回以内		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500~2000						
レタス	ヨウムシ	1000~1500	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内		
	オオタバコガ	1000						
非結球レタス	ヨウムシ	1000~1500	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内		
カリフラワー	オオタバコガ	1000	収穫14日前まで					
非結球あぶらな 科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、 たかな 、 ルッコラを除く)	アブラムシ類	1500	収穫21日前まで	1回	散布	1回		
しょうが	アワノメイガ	1000	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内		
ごぼう	アブラムシ類			1回		2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)		
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000	収穫開始7日前まで	1回	散布	1回		
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨウムシ		300	収穫30日前まで		2回以内	10a当り250散布 散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)
	アブラムシ類		1000~1500					
てんさい	ヨウムシ テンサイモグリハナバエ トビハムシ類	1000~1500 1000	収穫45日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、 散布は3回以内)		
	ヨウムシ	16 300						
	トビハムシ類	60~100	育苗期	1回	1㎡当り2.5~3ℓ灌注			
	未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	1000	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
あずき	フキノメイガ アブラムシ類、ヨウムシ	1000	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内		
だいず	ハスモンヨウ、マメシクイガ アブラムシ類		16				収穫60日前まで	
	えだまめ	ハスモンヨウ、アブラムシ類	1000				収穫21日前まで	
いんげんまめ	アブラムシ類	1000	収穫14日前まで					
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内		
		300						
		16						
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
ぶどう	チャノキアザミウマ フタテンヒメコバイ	1500~2000	収穫80日前まで	1回	散布	1回		
	ハマキムシ類	1500						

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かき	カキタアザミウマ チャノキアザミウマ カキハタムシガ フジコナカイガラムシ	1500	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
いちじく	アザミウマ類	2000	収穫45日前まで	1回	散布	1回
茶	チャノキアザミウマ チャノドリヒメコバイ	1000~2000	摘採45日前まで	1回	散布	1回
	チャノコクモハマキ	1000~1500				
さんしょう (果実)	チャノキアザミウマ	1500	収穫14日前まで	1回	散布	1回
だいおう	ヨウムシ	1000	生育期但し、 収穫230日前まで	3回以内		3回以内
みしまさいこ	アブラムシ類		収穫30日前まで	5回以内		3回以内
薬用にんじん		1500	収穫180日前まで			
ソルガム			収穫30日前まで			
やまのいも	ヤマノイモコガ ジャガイモゲナガアブラムシ	1000	収穫45日前まで	1回	散布	1回
葉しょうが	アワノメイガ		収穫21日前まで			
たばこ	ヨウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500~2500	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ヤサイゾウムシ	1000~2000	苗床期			
	ジャガイモ若齢幼虫 ジャガイモ中齢幼虫	1500~2000	収穫10日前まで			
つつじ類	ツツジゲンバイ	1500	発生初期	5回以内	散布	5回以内
つばき類	チャドクガ					
さくら	モンクロヤチホコ	1000~1500				
	アムカシロトリ	1500~2000				
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類 アオムシ、ヨウムシ類	1000~1500				
きく	マメハモグリバエ、オオタバコガ	1000	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ストック	コナガ、ハイマダラメイガ					
宿根アスター	ヨメナスジハモグリバエ					
オンシジウム	カイガラムシ類					
カーネーション	コナガ					
ひまわり	タバコガ					
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類					
樹木類	アザミウマ類					
グラジオラス						
芝	シバツトガ、タナヤガ					
	スジキリトウ、ケラ	1㎡当り 1~2ℓ散布				
	シバオサザウムシ成虫	1㎡当り 2ℓ散布				
	アカフツリガ					1㎡当り 0.5~1ℓ散布
もりあざみ	アブラムシ類	1500	収穫45日前まで	1回	散布	1回
まめ科牧草		1000		3回以内		3回以内