

ホクコーバサグラン®粒剤(ナトリウム塩)

■種類名：ベンタゾン粒剤
■有効成分：ベンタゾンナトリウム塩（ベンタゾン）----- 11.0%
®=BASF社の登録商標

■登録番号：第16122号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：1985.09.24
■性状：淡褐色細粒
■有効年限：5年
■包装：3kg×8袋

【特長】

- イネ科を除くコナギ等の一年生雑草やホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ等の多年生雑草に優れた効果を示す。
- 移植水稲ではクログワイ、エゾノサヤマカグサ、シズイ等のにも適用がある。
- 移植水稲と直播水稲で収穫45日前まで使用が可能。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	一年生雑草(イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤマカグサ シズイ	移植後15日～ 収穫45日前まで	3～4kg/10a	1回	落水散布 又は ごく浅く 湛水して散布	2回以内
直播水稲	一年生雑草(イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～ 収穫45日前まで	3kg/10a			

【効果・薬害等の注意】

- 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
 - ◆ 使用にあたっては落水状態(足跡に水が残っている状態)にして水の出入りをとめ、まきむらのないよう均一に散布すること。
 - ◆ 水を落とすことができないところでは、漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態(雑草が水面上に出る状態)にしてまきむらのないよう均一に散布すること。
 - ◆ 散布後少なくとも3日間(浅水処理は5日間)はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしないこと。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しないこと。
 - ◆ 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用すること。
 - ◆ 深水にすると効果が劣るので注意すること。
- イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用すること。
- 砂質土及び漏水のはげしい水田では使用しないこと。(減水深2cm/日以上)
- 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布すること。
ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生前期まで、クログワイでは草丈15cm以下、エゾノサヤマカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cmが本剤散布の適期である。
- クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。散布後は水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。