

お客様各位

2021年11月24日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2021年11月24日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第16129号 ホクコーバサグラン液剤 (ナトリウム塩)

適用変更の内容

- ・ 作物名「おうぎ」を追加する。
- ・ 作物名「たまねぎ」の使用時期「春播栽培の移植後6月上旬まで（雑草の3～4葉期）但し収穫30日前まで」を「春播栽培の移植後6月上旬まで 但し収穫30日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「たまねぎ」の使用時期「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで（雑草の3～4葉期）但し収穫30日前まで」を「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで 但し収穫30日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「らっきょう」の使用時期を「出芽後 但し収穫60日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「いんげんまめ」の使用時期を「初生葉展開期～本葉抽出始期」に変更する。
- ・ 作物名「えんどうまめ」の使用時期を「3～6葉期 但し収穫70日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「実えんどう」及び「さやえんどう」の使用時期を「3～6葉期 但し収穫40日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「とうもろこし」及び「飼料用とうもろこし」の使用時期を「生育期 但し収穫50日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「ソルガム」の使用時期を「生育期 但し収穫30日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「麦類（小麦を除く）」の使用時期を「生育期 但し収穫90日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「小麦」、「はとむぎ」及び「べにばないんげん」の使用時期を「生育期 但し収穫45日前まで」に変更する。

[次頁に続く](#)

前頁から続く

【変更後の適用内容 (変更・追加部分)】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンタゴンを含 む農薬の総 使用回数
			薬量	希釈水量			
たまねぎ	一年生 雑草 (イネ科 を除く)	春播栽培の 移植後6月上旬まで 但し 収穫30日前まで	60~120 mL/10a	70~100 L/10a	1回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1回
		秋播栽培の 移植後生葉4葉期まで 但し 収穫30日前まで					
らっきょう		出芽後 但し 収穫60日前まで	100~200 mL/10a				
いんげんまめ		初生葉展開期~ 本葉抽出始期	50~70 mL/10a				
えんどうまめ		3~6葉期 但し 収穫70日前まで	100~200 mL/10a				
実えんどう さやえんどう		3~6葉期 但し 収穫40日前まで					
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 但し 収穫50日前まで	100~150 mL/10a				
ソルガム		生育期 但し 収穫 30 日前まで					
麦類 (小麦を除く)		生育期 但し 収穫90日前まで	100~200 mL/10a				
小麦		生育期 但し 収穫45日前まで					
はとむぎ		生育期 但し 収穫45日前まで	150 mL/10a				
おうぎ		生育期 但し 収穫30日前まで	200 mL/10a				
べにばないんげん	生育期 但し 収穫45日前まで	100~200 mL/10a	70~100 L/10a	1回	畦間雑草 茎葉散布	1回	

【変更後の注意事項 (変更・追加部分)】

(変更部分)

- 本剤は一年生広葉雑草に有効であるが、作物ごとに使用薬量等が異なるので、時期を失しないように、雑草茎葉にかかるよう均一に散布すること。
各作物の雑草への散布適期は以下のとおりである。
 - らっきょう、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類(小麦を除く)、小麦、はとむぎ、田執行役員含むせり、おうぎ 雑草3~6 葉期
 - べにばないんげん 雑草の生育初期~6 葉期
 - たまねぎ 雑草の3~4 葉期
 - いんげんまめ 雑草の2~3 葉期

(追加部分)

- おうぎに使用する場合、本剤は一時的には葉先の黄化等の薬害を生じることがあるので、特に天候等をよくみきわめてから散布すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上