

お客様各位

2021年8月31日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2021年8月31日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第17387号 ホクコーバリダシン液剤5

適用変更の内容

- ・ 作物名「未成熟とうもろこし」、「ブロッコリー」、「うめ」を追加する。
- ・ 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「レタス」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- ・ 作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「ねぎ」のバリダマイシンを含む農薬の総使用回数を「2回以内（は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計1回以内）」から「3回以内（は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計2回以内）」に変更し、希釈倍数「500倍」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫前日まで」、本剤の使用回数を「1回」から「2回以内」に変更する。
- ・ 作物名「にんにく」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「みつば」の使用時期を「移植後 但し 収穫21日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」から「移植後 但し 収穫7日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」に変更する。
- ・ 作物名「かんきつ」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
作物名「すもも」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	紋枯病	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	黒腐病	800倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
うめ	かいよう病	500倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内

次ページへ続く

前ページから続く

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	パリダマインを 含む農薬の 総使用回数
だいこん	軟腐病	500 倍	100～300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
ねぎ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	400 倍	6L/m ²	は種時	1 回	灌注	3回以内 (は種時の灌注は 1回以内、 散布及び株元散 布は合計 2回以内)
	軟腐病	500 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	
	白絹病					株元散布	
レタス	すそ枯病 腐敗病 軟腐病	800 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス				収穫3日前 まで			
にんにく	春腐病	800 倍	100～300 L/10a	収穫3日前 まで	5回以内	散布	5回以内
みつば	立枯病	800 倍	100～300 L/10a	育苗期 移植後 但し 収穫7日前 まで、 伏せ込み栽培 は伏せ込み前 まで	1 回 3回以内	散布	4回以内 (育苗期は 1回以内、 移植後は 3回以内)
かんきつ	かいよう病	500 倍	200～700 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
すもも	黒斑病	500 倍	200～700 L/10a	収穫3日前 まで	4回以内	散布	4回以内

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上