

お客様各位

2019年6月12日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2019年6月12日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第17661号 ホクコークレマー<sup>®</sup>ト乳剤

### 適用変更の内容

適用内容を以下のとおり変更し全体を別紙1のとおりとする。

- ・ 適用土壌及び適用地帯を削除する。
- ・ 作物名「漬物用すいか」を追加する。
- ・ 作物名「ケナフ」を追加する。
- ・ 作物名「たまねぎ」を追加し、作物名「たまねぎ（春播栽培）」及び「たまねぎ（秋播栽培）」を削除する。

### 効果・薬害に関する注意事項に下記を追加する。

- ・ たまねぎに使用する場合、春先などの気温が高くなる時期の散布は薬害を生じるおそれがあるので十分に注意すること。

### 安全使用上の注意事項に下記を追加する。

- ・ 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

別紙1

#### 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ブタリスを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
メロン 漬物用メロン すいか <u>漬物用すいか</u> かぼちゃ	一年生雑草	定植・マルチ前 (雑草発生前)	200~400 mL/10a	100~150 L/10a	1回	全面土壌散布	1回
レタス なす		定植前又は 定植・マルチ前 (雑草発生前)					
キャベツ きゅうり いちご		定植前 (雑草発生前)					
ねぎ わけぎ あさつき		定植活着後 (雑草発生前) 但し 定植10日後まで					

次頁へ続く

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ブタホスを含む農薬の総使用回数	
			薬量	希釈水量				
ばれいしょ さといも にんにく らっきょう やまのいも	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	200~400 mL/10a	100~150 L/10a	1回	全面土壌散布	1回	
らっかせい にんじん パセリ		は種後萌芽前 (雑草発生前)						
こんにゃく		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し 収穫120日前まで						
たまねぎ		春播栽培の定植後 (雑草発生前) 但し 収穫60日前まで						
		秋播栽培の定植後 (秋季の雑草発生前) 但し 収穫60日前まで						
アスパラガス		萌芽前 (雑草発生前)						
ピーマン とうがらし類		定植前 (雑草発生前)						200 mL/10a
はくさい とうがん ブロッコリー ひろしまな								
うど		定植後出芽前 (根株養成圃) (雑草発生前)						200~400 mL/10a
わらび		株養成期 (地上部なし) (雑草発生前)						
グラジオラス	植付後 (雑草発生前)							

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ブタホスを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
きく (ポットマム)	一年生雑草	定植後 (雑草発生前)	200~400 mL/10a	100~150 L/10a	1回	全面土壌 散布	1回
	アメリカナシズラ	定植後 (雑草発生揃期まで)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	
つつじ類	一年生雑草	植付後又は生育期 (雑草発生前)	200 mL/10a	300~400 mL/10a	1回	全面土壌 散布	3回以内
たばこ (折衷マルチ栽培)		植付10日前まで (雑草発生前)					1回
ケナス		は種後出芽前					1回

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上