ホクコーブラシン®粉剤ＤＬ

■種 類 名：フェリムゾン・フサライド粉剤
■有効成分：フェリムゾン----------2.0%
フサライド----------1.5%
■PRTR法指定物質：フェリムゾン［第１種］----------2.0%
フサライド［第１種］----------1.5%

■登録番号：第17949号
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：1991.11.01
■性　　状：類白色粉末　45μm以下
浮遊性指数20以下
■有効年限：４年
■包　　装：3kg×8袋

【特長】
- 治療効果にすぐれるフェリムゾンと、予防効果に定評のあるフサライドの混合剤で、散布適期幅が広い。
- ごま葉枯病や変色米など穂枯れ性病害にも有効な総合殺菌剤である。
- 稲こうじ病のほか内頴褐変病やもみ枯細菌病にも有効。

【適用内容】（2014 年 10 月末日現在）

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) (すじ葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌) (エピコッカム菌)	３～４ kg/10a	収穫７日前まで	２回以内	散布	２回以内	３回以内
	内頴褐変病 稲こうじ病 もみ枯細菌病	4kg/10a					

【効果・薬害等の注意】
- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散布機の開度を一目盛程しぼって散布すること。
- 本剤はいもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できるが、多発時の内頴褐変病、稲こうじ病、もみ枯細菌病のみの防除には効果が劣ることがあるので注意すること。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】
- 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン･長袖の作業衣などを着用すること。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。