

# ホクコーブラシ<sup>®</sup>フアブル

- 種類名：フェリムゾン・フサライド水和剤
- 有効成分：フェリムゾン----- 15.0%  
フサライド----- 15.0%
- PRTR法指定物質：フェリムゾン [第1種] ----- 15.0%  
フサライド [第1種] ----- 15.0%

- 登録番号：第19166号
- 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 登録初年：1996.03.12
- 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
- 有効年限：5年
- 包装：500ml×20本

## 【特長】

- 治療効果にすぐれるフェリムゾンと、予防効果に定評のあるフサライドの混合剤で、散布適期幅が広い。
- ごま葉枯病や変色米など穂枯れ性病害にも有効な総合殺菌剤である。
- 稲こうじ病のほか内穎褐変病やもみ枯細菌病にも有効。

## 【適用内容】 (2017年10月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 褐条病 変色米 (カーブラリア菌) (エピコッカム菌) (アルタナリア菌) 稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 墨黒穂病	1000倍	60～150 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内
	いもち病	300倍	25 ℓ/10a					

## 【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきることを。
- 本剤は長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出すこと。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布すること。
- 褐条病を対象とした採種圃場での散布は、翌年の育苗箱中での本病の発生抑制を目的としているが、効果がやや劣ることがあるので、種子消毒処理を併用することが好ましい。
- 本剤はいもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できるが、多発時の内穎褐変病の防除には効果が劣ることがあるので注意すること。
- 本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲などのないよう注意すること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさげ、なるべく低温な場所に密封して保管すること。