

リンバー®粒剤

■種類名：フラメトピル粒剤
■有効成分：フラメトピル-----1.5%
■殺菌剤分類：7

■登録番号：第19366号（住友化学登録）
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：1996.10.29
■性状：淡灰色細粒
■有効年限：4年
■包装：3kg×8袋

【特長】

- 粒剤タイプの紋枯病防除剤で、残効性に優れる。
- 稲体への吸収移行性があり、予防・治療効果を有する。
- 疑似紋枯症にも高い効果を示す。

【適用内容】（2026年4月末日現在）

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病 疑似紋枯症（褐色菌核病菌） 疑似紋枯症（赤色菌核病菌）	3~4kg/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内 （直播での種時又は移植時までの処理は1回以内）

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきることを。
- 散布に当っては湛水状態（水深3cm以上）で播きむらのないよう均一に散布し、散布後少なくとも3~4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用をさけること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
散布後は可川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。