

# マネージ®DF

■種類名：イミベンコナゾール水和剤  
 ■有効成分：イミベンコナゾール-----30.0%  
 ■PRTR法指定物質：ドデシル硫酸ナトリウム [第1種] -----1.8%

■登録番号：第19454号  
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
 ■登録初年：1996.12.09  
 ■性状：淡褐色水和性細粒  
 ■有効年限：4年  
 ■包装：100g×100袋

## 【特長】

- マネージ剤を独自の製剤技術でドライフロアブル化。
- ドライフロアブル化により薬液調製時の粉立ちが少なく取り扱いが容易。

## 【適用内容】(2020年10月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミベンコナゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、赤星病 うどんこ病	4000～ 6000	200～700 ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
なし	黒星病 赤星病	6000～ 8000					
ぶどう	うどんこ病 黒とう病、さび病	4000～ 6000		収穫30日前まで	2回以内		
かんきつ	そうか病	2000		収穫7日前まで			
あんず	灰星病			収穫45日前まで			
もも	黒星病	4000		展葉期～硬核期	3回以内		
うめ			収穫45日前まで				
すいか メロン	うどんこ病	2000	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
茶	炭疽病	2000～ 4000	200～400 ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	2回以内	

## 【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤を希釈する際は、タンク又は桶に水を入れ、攪拌しながら徐々に薬剤を投入すること。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。
- なしの赤梨系（長十郎、幸水）に使用する場合、誤って高濃度で散布すると葉に薬害を生じる恐れがあるので、所定範囲内の使用を厳守すること。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。