

# 日農ロムダン®エア

■種類名：テブフェノジド水和剤  
■有効成分：テブフェノジド----- 20.0%  
■化管法指定物質：テブフェノジド [第1種] ----- 20.0%

■登録番号：第19514号（日本農薬登録）  
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
■登録初年：1997.02.07  
■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体  
■有効年限：3年  
■包装：5ℓ×4缶

## 【特長】

- 昆虫成長制御剤(IGR剤)で、鱗翅目害虫の脱皮を促進することにより殺虫効果を示す。
- 鱗翅目害虫にのみ極めて高い効果を示す。
- 稲、だいに適用がある。
- 無人ヘリコプター専用剤。

## 【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数
稲	コブノメイガ ニカメイチュウ	16倍	800 ml /10a	収穫21日前 まで	2回以内	無人 ヘリコプター による散布	2回以内
だいに	ハスモンヨトウ			収穫14日前 まで	3回以内		3回以内

## 【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきることを。
- 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施すること。
- 微量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。
- 散布機種種に適合した散布装置を使用すること。
- 散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- 散布薬液の飛散によって自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- 散布終了後は次の事項を守ること。
  - ◆ 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理すること。
  - ◆ 機体の散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、養蚕地帯では使用しないこと。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように十分注意して散布すること。  
なお、使用にあたっては、事前に蚕業関係者と安全対策について十分協議すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。