

ホクコーオリゼメート[®] 1キログラム粒剤

■種類名：プロベナゾール粒剤

■有効成分：プロベナゾール ----- 24.0%

■登録番号：第19542号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：1997.02.10

■性状：類白色細粒

■有効年限：5年

■包装：1kg×12袋

【特長】

- 植物の病害抵抗性を誘導して高い効果を示す抵抗性誘導型いもち病防除剤。
- 10アール1kg施用なので省力的。
- イネ白葉枯病、もみ枯細菌病にも効果を示す。

【適用内容】(2017年10月末日現在)

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病	1~1.3kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

【効果・葉害等の注意】

- 本剤は湛水状態(湛水深3~5cm)でまきむらのないよう均一に散布し、散布後少なくとも4~5日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 砂質土など漏水の多い水田での使用はさけること。
- 養魚田での使用はさけること。
- 本剤は予防的に散布した場合に有効である。葉いもち防除の使用適期は、初発の7~10日前であるので、発生予察情報に注意して時期を失ないように散布すること。穂いもち防除の使用適期は、出穂の3~4週間前である。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- ❖ 夏期高温時の使用を避けること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。