

お客様各位

平成 28 年 12 月 2 日
北興化学工業株式会社

農薬登録情報

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、平成 28 年 11 月 30 日付で下記農薬の適用が拡大登録されましたので、お知らせ致します。

記

農薬名

第 20798 号 **ダントツ水溶剤** (登録会社 住友化学株式会社)

適用拡大の内容

- ・作物名「いんげんまめ」の使用時期「収穫 7 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「4000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「レタス」の希釈倍数「2000 倍」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「ピーマン」の希釈倍数「2000～4000 倍」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加する。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ、ハモグリバエ類」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「かぼちゃ」に適用病害虫名「ウリハムシ」を追加する。
- ・作物名「すいか」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「4000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「メロン」の希釈倍数「2000～4000 倍」に適用病害虫名「ウリハムシ」を追加する。
- ・作物名「メロン」の適用病害虫名「トマトハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「にがうり」に適用病害虫名「アブラムシ類」、希釈倍数「2000 倍」を追加する。
- ・作物名「かんきつ」の適用病害虫名「ミカンキジラミ、コナジラミ類」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「なし」の適用病害虫名「チュウゴクナシキジラミ」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「すもも」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「4000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「オリーブ」に適用病害虫名「ミナミアオカメムシ」、希釈倍数「2000 倍」を追加し、適用病害虫名「オリーブアナアキゾウムシ」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「花き類・観葉植物」に適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000 倍」を追加する。
- ・作物名「きく」、使用方法「散布」の適用病害虫名「アザミウマ類」の希釈倍数を「2000 倍」から「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「ばら」の適用病害虫名「ミカンキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「オリーブ(葉)」、「くわい」、「なつめ」、および「デイゴ」を追加する。

変更部分は次頁の【別表】の通り。

適用拡大後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

【別表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチフェンを含む農薬の総使用回数
いんげんまめ	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	インゲンマダラムシ	2000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類	1000倍	25L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、 植付後は3回以内)
	テントウムシダマシ類	2000～4000倍					
レタス	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内 (育苗期の株元処理は1回以内、 散布は2回以内)
	ヘダリバエアザミヤカ類	2000倍					
ピーマン	アブラムシ類 コジラネ類 カハムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
	シキイロアザミヤカ	2000倍					
なす	シキイロアザミヤカ ヘダリバエ類 アブラムシ類 コジラネ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計3回以内)
かぼちゃ	アブラムシ類 カハムシ	2000～4000倍					
すいか	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)
	シキイロアザミヤカ カハムシ	2000倍					
メロン	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計3回以内)
	コジラネ類 シキイロアザミヤカ カハムシ ヘダリバエ類	2000～4000倍					
にがうり	シキイロアザミヤカ	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)
	アブラムシ類	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クチアジンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 シシトメノミカ アザミヤカ類 ケキスビ類 コアカサノミ ツノムシ コカサノミ類 ゴマダカミドリ カミシ類 アゲハ類 アカカサノミ ナマルカサノミ シシトメ ミカンキジラミ コサノミ類	2000～4000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	6回以内 (樹幹散布は 3回以内、 散布は3回以内)
	カサノミ	2000倍					
	シシトメノミカ ゴマダカミドリ	20倍	100mL/樹	収穫150日前 まで		樹幹 散布	
	ミカンキジラミ	40倍	200mL/樹				
なし	シシトメノミカ アブラムシ類 コカサノミ類 カミシ類 ケキスビ類 チュウゴクミカンキジラミ	2000～4000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	3回以内
すもも	カミシ類 アブラムシ類	2000～4000倍		収穫3日前まで			
オリーブ	オリーブアザミヤカ ミカンカミシ	2000～4000倍 2000倍		収穫前日まで			
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a		4回 以内	生育 期 株元 灌注	4回以内
	アザミヤカ類	2000倍					
きく	ハダカバエ アブラムシ類 アザミヤカ類	4000倍	1L/m ²	発生初期	4回 以内	散布	4回以内
	アザミヤカ類 ハダカバエ類 カミシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a				
ばら	カサノミ類	2000倍	1L/m ²		4回 以内	生育 期 株元 灌注	4回以内
	アザミヤカ類	2000～4000倍	100～300 L/10a				
オリーブ(葉)	オリーブアザミヤカ	4000倍	200～700 L/10a	収穫120日前 まで	2回 以内	散布	2回以内
くわい	アブラムシ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回 以内		3回以内
なつめ	ゴマダカミドリ	4000倍	200～700 L/10a				
デイゴ	デイゴヒコバチ	2000倍	200～700 L/10a	発生初期	5回 以内		5回以内

以上