

お客様各位

2018年9月27日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2018年9月26日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第20798号 *ダントツ水溶剤* (登録会社 住友化学株式会社)

適用変更の内容

- ・ 作物名「稲」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「イネアザミウマ」を追加する。
- ・ 作物名「稲」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「稲（箱育苗）」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「未成熟とうもろこし」に適用病害虫名「アカスジカスミカメ」を追加する。
- ・ 作物名「あずき」、適用病害虫名「マメホソクチゾウムシ」を追加し、作物名「豆類(種実、ただし、らっかせい、だいず、いんげんまめを除く)」を「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)」に変更する。
- ・ 作物名「キャベツ」の希釈倍数「2000～4000倍」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- ・ 作物名「なす」に適用病害虫名「テントウムシダマシ類」を追加する。
- ・ 作物名「なす」に適用病害虫名「カメムシ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・ 作物名「きゅうり」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加する。
- ・ 作物名「かぼちゃ」に適用病害虫名「カボチャミバエ」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・ 作物名「すいか」の適用病害虫名「ウリハムシ」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。
- ・ 作物名「にがうり」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。
- ・ 作物名「オリーブ（葉）」に適用病害虫名「マエアカスカシノメイガ」を追加する。
- ・ 作物名「びわ」に適用病害虫名「カミキリムシ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・ 作物名「ブルーベリー」に適用病害虫名「オウトウショウジョウバエ」を追加する。
- ・ 作物名「かき」の適用病害虫名「カキノヒメヨコバイ」の希釈倍数「4000倍」を「2000～4000倍」に変更する。
- ・ 作物名「キウイフルーツ」に適用病害虫名「アオハハゴロモ」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・ 作物名「オリーブ」の希釈倍数「2000～4000倍」に適用病害虫名「マエアカスカシノメイガ」を追加する。
- ・ 作物名「オリーブ」の適用病害虫名「ミナミアオカメムシ」を「カメムシ類」に変更する。・ 作物名「花き類・観葉植物」の適用病害虫名「アザミウマ類」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワジリンを含む農薬の総使用回数
稲	ウカ類 ツカ ^ゴ ロコバ ^イ カムシ類 イト ^ゴ オイシ イト ^ゴ ミマ	4000倍	60～150 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、 <u>無人航空機散布は合計3回以内</u>)
	ウカ類 カムシ類 イト ^ゴ オイシ	1000倍	25L/10a				
稲 (箱育苗)	ウカ類 ツカ ^ゴ ロコバ ^イ フカ ^レ コカ ^ゴ	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 500mL	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、 <u>無人航空機散布は合計3回以内</u>)
	イト ^ゴ オイシ イト ^ゴ ゾウムシ	200～400倍					
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類 <u>カズミカズミ</u>	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
豆類 (種実、ただし、 だいず、 <u>あずき</u> 、 いんげんまめ、 らっかせいを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
あずき	<u>マホクダゾウムシ</u>	4000倍					
キャベツ	アブラムシ類 <u>アサミ</u> 類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	2回以内		3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
	アオムシ コカ ^ゴ	2000倍					
なす	シキイロアサミマ ホク ^レ バ ^エ 類 アブラムシ類 コジ ^ラ ミ類 <u>テトウミダマ</u> 類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内		4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
	カムシ類	2000倍					
きゅうり	シキイロアサミマ アブラムシ類 コジ ^ラ ミ類 カムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内		4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
かぼちゃ	アブラムシ類 ウラムシ	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	
	<u>カチャバエ</u>	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カチニジンを含む農薬の総使用回数		
すいか	アブラムシ類 カハムシ	2000～ <u>4000</u> 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)		
	シキイロアザミヤ	2000倍							
にがうり	シキイロアザミヤ アブラムシ類	2000～ <u>4000</u> 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内		4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)		
オリーブ(葉)	オリーブアザミヤ マエカサシメカ	4000倍	200～700 L/10a	収穫120日前まで	2回以内		2回以内		
びわ	アブラムシ類 カハムシ類 カガラムシ類	2000～4000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	3回以内		散布	3回以内	
	カキムシ類	2000倍							
ブルーベリー	アブラムシ類 カハムシ類 カトシヨウジョウハ	2000～4000倍	200～700 L/10a	収穫45日前まで	3回以内			3回以内	
かき	アザミヤ類 コカガラムシ類 カハムシ類 カハムシ類 カキムシ類	2000～ <u>4000</u> 倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで	3回以内			3回以内	
キウイフルーツ	カキムシ類 カハムシ類	2000～4000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	3回以内			散布	3回以内
	カハムシ類	2000倍							
オリーブ	オリーブアザミヤ マエカサシメカ	2000～4000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布			2回以内
	カハムシ類	2000倍							
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類 アザミヤ類	2000～ <u>4000</u> 倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内				4回以内

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上