

お客様各位

2019年12月10日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2019年12月4日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第20798号 **ダントツ水溶剤** (登録会社 住友化学株式会社)

適用変更の内容

- ・ 作物名「かんしょ」を追加する。
- ・ 作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・ 作物名「なす」の適用病害虫名「カメムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。
- ・ 作物名「かんきつ」の希釈倍数「2000～4000倍」に適用病害虫名「アオバハゴロモ」を追加する。
- ・ 作物名「りんご」に適用病害虫名「コガネムシ類成虫」を追加する。
- ・ 作物名「キウイフルーツ」の適用病害虫名「アオバハゴロモ」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カチニジンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (植付前の処理は1回以内、植付後は2回以内)
しゅんぎく	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
なす	シキイロアザミ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コガネムシ類 テントウムシダマシ類 カメムシ類	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)

次頁に続く

続き

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	クチアジンを 含む 農薬の 総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ゲキスイ類 コオハナムグリ ツノロウムシ コカカイラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイラムシ ナシマルカイラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類 アオハハコロモ	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	6 回以内 (樹幹散布は 3 回以内、 散布は 3 回以内)
	カナタキ	2000 倍					
	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ	20 倍	100mL/樹	収穫 150 日前 まで		樹幹 散布	
	ミカンキジラミ	40 倍	200mL/樹				
りんご	カメムシ類 キンモンホリガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 コカカイラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
キウフルーツ	キウヒメヨコバイ カメムシ類 アオハハコロモ	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上