

お客様各位

2017年7月13日
北興化学工業株式会社

農薬登録情報

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2017年7月12日付で下記農薬の適用が拡大登録されましたので、お知らせ致します。

記

農薬名

第20813号 ホクコースタークル顆粒水溶剤

適用拡大の内容

- ① 「ねぎ」の適用病害虫名「アザミウマ類」の使用法「株元灌注」の希釈倍数及び使用液量に「1000倍」及び「1L/m²」を追加する。
- ② 「しよくようほおずき」、「食用ミニバラ」、「食用カーネーション」、「食用パンジー」、「食用金魚草」、「食用ぎく」の適用病害虫名に「コナジラミ類」を追加する。
- ③ 「食用トレニア」の適用病害虫名に「アブラムシ類」を追加する。

【変更部分抜粋】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
ねぎ	—	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
		アザミウマ類 ハモグリバエ類 シイモリヨトウ タバエ ネコガ	50倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	
		アザミウマ類	1000倍	1L/m ²	生育期 但し、収穫 14日前まで	株元灌注		
		ハモグリバエ類 トビイロヨトウゾウムシ	400倍	0.4L/m ²				
食用トレニア	—	アブラムシ類 コナジラミ類	—	—	—	—	—	
しよくようほおずき 食用ミニバラ 食用カーネーション 食用パンジー 食用金魚草	—	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内

食用ぎく					収穫7日 前まで			3回以内 (定植時の土壌 混和は1回 以内、散布は 2回以内)
------	--	--	--	--	-------------	--	--	---

適用拡大後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上