

お客様各位

2018年11月22日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
此の度、2018年11月21日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第20813号 ホクコースタークル顆粒水溶剤

### 適用変更の内容

- ・ 作物名「トマト」、「ミニトマト」の適用病害虫名に「カメムシ類」を追加する。
- ・ 作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名に「ウリハムシモドキ」を追加する。
- ・ 作物名「かんしょ」の適用病害虫名に「アブラムシ類」を追加する。
- ・ 作物名に「さとうきび」を追加する。
- ・ 作物名「かぼちゃ」の使用方法に「灌注」を追加する。
- ・ 作物名「かぼちゃ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）」を「3回以内（定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「かき」の適用病害虫名に「チャノキイロアザミウマ」及び「カキクダアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・ 作物名「稲」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「4回以内（育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人機散布は合計3回以内）」を「4回以内（育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。

※変更部分適用表は次頁参照

【変更後】(部分)

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト		カメシ類	2000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	5回以内 (培土混和及び灌注は合計 1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
		コナジラミ類	2000~3000倍					
ほうれんそう		アブラムシ類 ウハムシモドキ	3000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
かんしょ		アブラムシ類、コナジラミ類						1回
さとうきび	—	アブラムシ類 カンジャコバネナガカメシ	2000倍		収穫45日前まで	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
かぼちゃ		アブラムシ類	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5~4.0L)当り0.5L	定植前日~定植時	1回	灌注	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
かき		カメシ類、アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ	2000倍	200~700L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (塗布は1回以内、散布は3回以内)
稲		カメシ類 ウンカ類 ツマゲロヨコバイ	3000倍	60~150L /10a	収穫7日前まで			4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート\(SDS\)一覧\)](#) からご参照下さい。

以上