

ホクコースタークル[®]粉剤DL

■種類名：ジノテフラン粉剤

■有効成分：ジノテフラン----- 0.50%

■登録番号：第20816号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2002.04.24

■性状：類白色粉末 45μm以下
浮遊性指数 20以下

■有効年限：5年

■包装：3kg×8袋

【特長】

- フラニコチニル系殺虫剤ジノテフランの粉剤。
- 殺虫スペクトラムが広く、水稻生育中期から後期の防除剤として有効。
- 幅広い種類のカメムシ類に高い効果を示す。
- だいず、えだまめにも適用がある。

【適用内容】(2023年10月末日現在)

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	3kg /10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計1回以内、本 田での散布、空中 散布、無人航空機 散布は合計3回 以内)
だいず えだまめ		カメムシ類 フタジヒメハムシ ダイズサヤマバエ			2回以内		3回以内 (は種時の土壌 混和は1回以 内、散布、空中 散布、無人航空 機散布は合計 2回以内)
水田作物、 畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソ ウ等の多年生雑草が 優占している休耕田	カメムシ類		—	3回以内		3回以内

【効果・薬害等の注意】

- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ◆ ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。作業後はうがいをすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。