ホクコーラブサイドスタークル粉剤ＤＬ

■種 類 名：ジノテフラン・フサライド粉剤
■有効成分：ジノテフラン---------- 0.35%
　　フサライド---------- 2.5%
■化管法指定物質：フサライド［第１種］ ---------- 2.5%

■登録番号：第21025号
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：2003.02.25
■性　　状：類白色粉末　45μm以下
　　浮遊性指数　20以下
■有効年限：5年
■包　　装：3kg×8袋

【特長】

- いもち病防除剤ラブサイドと斑点米カメムシ等に効果の高いスタークルとの混合粉剤。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3～4kg/10a	収穫７日前まで	３回以内	散布	４回以内 （育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計３回以内）	３回以内
	イナゴ類 ニカメイチュウ	4kg/10a					

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布すること。
- 本剤はいもち病発生に際して予防的に散布した方がより効果的である。葉いもちに対しては発生が予想される場合又は初発生をみたら直ちに散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないこと。
  - ◆ 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
  眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン･長袖の作業衣などを着用すること。
  作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。