

お客様各位

2021年12月22日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2021年12月22日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第21259号 スタークル液剤10 (登録会社 三井化学アグロ株式会社)

変更の内容

- ・ 作物名「だいこん」を追加する。
- ・ 作物名「キャベツ」を追加する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」を追加する。
- ・ 作物名「ねぎ」を追加する。
- ・ 作物名「さとうきび」の使用時期「収穫45日前まで」を「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 「だいず」及び「えだまめ」の適用病害虫名「フタスジヒメハムシ」に使用方法「無人航空機による散布」及び「空中散布」を追加する。
- ・ 作物名「だいず」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)」に変更する。
- ・ 作物名「えだまめ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)」に変更する。

【変更後の適用内容 (追加、変更する作物のみ抜粋)】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	8~16倍	1.6L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回以内、 は種時の全面土壌混和は1回以内、 粒剤の散布は1回以内、 水溶剤の散布、液剤の散布 及び無人航空機散布は 合計2回以内)
キャベツ				収穫3日前まで			3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌漑は 合計1回以内、 散布及び無人航空機散布は 合計2回以内)

次ページへ続く

前ページから続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトアトランを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アザミウマ類	10～16倍	1.6L/10a	収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、 散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
ねぎ							4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、 生育期の株元灌注は1回以内、 散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
さとうきび	カシヤバネガカミシ 付ゴ類	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、 液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
		14倍	2.4L/10a			無人航空機による散布	
だいず	カミシ類 ダイズサヤマバエ フタスジヒハムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は合計2回以内)
	カミシ類 ダイズサヤマバエ フタスジヒハムシ	8倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
						空中散布	
えだまめ	カミシ類 ダイズサヤマバエ フタスジヒハムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は合計2回以内)
	カミシ類 ダイズサヤマバエ フタスジヒハムシ	8倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
						空中散布	

【使用上の注意事項(変更部分)】

- ・ 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
◆散布にあつては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上