

# スタークル<sup>®</sup>1 キロH粒剤

■種類名：ジノテフラン粒剤

■有効成分：ジノテフラン-----3.0%

■登録番号：第21276号(三井化学アグロ登録)

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2004.04.21

■性状：類白色細粒

■有効年限：5年

■包装：1kg×12袋  
10kg×2袋(地域限定)

## 【特長】

- フラニコチル系殺虫剤ジノテフランの1キロ粒剤。
- 幅広い種類の斑点米カメムシに高い効果を示す。

## 【適用内容】(2020年8月12日現在)

| 作物名 | 適用害虫名                                 | 使用量     | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法                 | ジノテフランを含む農業の総使用回数   |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| 稲   | ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ<br>カメムシ類<br>イネミズゾウムシ | 1kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内    | 散布<br><br>無人航空機による散布 | 4回以内<br>(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |

## 【効果・葉害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 本剤を使用する場合には、湛水状態(3cm程度)で田面に均一に散布し、4~5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないこと。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
  - ◆ 事前に薬剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整し、飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布装置のインペラの回転数を調整し、圃場の端から5m離れた位置から圃場内に散布すること。
  - ◆ 散布薬剤の飛散によって他の動植物等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
  - ◆ 薬剤が水源池、飲料用水、養殖池、養魚田などに飛散、流入しないように十分注意すること。
  - ◆ 使用後の空袋は圃場などに放置せず、安全な場所に適切に処理すること。
  - ◆ 使用後の機体散布装置は十分洗浄し、タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
  - ◆ 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に責任者を決めて保管すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ◆ ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
  - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 使用に際しては、保護眼鏡、マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用し、作業後は顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗い、洗眼・うがいをすること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。  
無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。  
散布後は水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。