ホクコーラブサイドキラップ粉剤ＤＬ

■種 類 名：エチプロール・フサライド粉剤
■有効成分：エチプロール---------- 0.50%
　　フサライド---------- 2.5%
■化管法指定物質：フサライド［第１種］ ---------- 2.5%

■登録番号：第21855号
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：2006.11.29
■性　　状：類白色粉末　45μm以下
　　浮遊性指数　20以下
■有効年限：5年
■包　　装：3kg×8袋、20kg×1袋

【特長】

- いもち病防除剤として効果の高いラブサイドと殺虫剤キラップの混合粉剤。
- エチプロールの作用により、カメムシ類に対して安定した防除効果を発揮する。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	3～4 kg/10a	収穫 14 日前まで	２回以内	散布	２回以内 （は種時(直播)又は移植時までの処理は１回以内）	３回以内

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を１目盛程度しぼって散布すること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
  - ◆ 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 空袋は圃場などに放置せず適切に処理すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
  誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン･長袖の作業衣などを着用すること。
  作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。