

## リンバー®顆粒水和剤

- 種類名：フラメトピル水和剤
- 有効成分：フラメトピル----- 50.0%
- PRTR法指定物質：ドデシル硫酸ナトリウム [第1種] ----- 4.0%

- 登録番号：第21876号（住友化学登録）
- 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 登録初年：2007.01.24
- 性状：類白色水和性細粒
- 有効年限：5年
- 包装：500g×20袋

## 【特長】

- 優れた浸透移行性があり、てんさいの根腐病と葉腐病、ばれいしょの黒あざ病、ねぎの白絹病に高い効果を示す。
- てんさいには定植前灌注処理も可能。

## 【適用内容】（2020年1月15日現在）

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
てんさい	根腐病	800倍	1ℓ/ペーパーポット1冊	定植前	1回	灌注	4回以内 (定植前の灌注は1回以内、散布は3回以内)
	根腐病 葉腐病	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
ばれいしょ	黒あざ病	1000倍	—	植付前	1回	瞬間～10分間 種いも浸漬	1回
ねぎ	白絹病	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	株元散布	3回以内

## 【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲、誤食などのないよう注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。