

お客様各位

2022年10月12日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2022年10月12日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第22464号 プレバゾンフロアブル5 (登録会社 エフエムシー・ケミカルズ株式会社)

適用変更の内容

- ・ 作物名「かんしょ」に適用害虫名「アリモドキゾウムシ」を、希釈倍数「2000～4000倍」及び使用方法「散布」にて、また希釈倍数「16倍」、使用方法「無人航空機による散布」及び使用液量「0.8～1.6L/10a」で追加する。
- ・ 作物名「かんしょ」の適用害虫名「ナカジロシタバ」にて、希釈倍数「4000倍」を「2000～4000倍」に変更する。
- ・ 作物名「キャベツ」、「はくさい」、「だいこん」及び「はつかだいこん」の適用害虫名「カブラハバチ」を「カブラハバチ類」に変更する。
- ・ 作物名「ひろしまな」を「非結球はくさい」に変更する。
- ・ 作物名「非結球あぶらな科葉菜類（タアサイ、ひろしまな、なばな類を除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（タアサイ、非結球はくさい、なばな類を除く）」に変更する。
- ・ 作物名「非結球レタス」に、使用方法「無人航空機による散布」を希釈倍数「20倍」及び使用液量「1～2L/10a」で追加する。
- ・ 作物名「非結球レタス」のクロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数について、「4回以内（灌注は1回以内、散布は3回以内）」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内）」に変更する。

【変更後の適用内容（変更された作物）】

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
|---------|---------------------------------|------------|--------------|--------|---------|------------|-------------------------|
| かんしょ | ハスモンヨトウ アリモドキゾウムシ ナカジロシタバ | 2000～4000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | | 16倍 | 0.8～1.6L/10a | | | 無人航空機による散布 | |
| だいこん | コナガ、アオムシ ヨトウムシ | 2000 | 100～300L/10 | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はつかだいこん | ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 ハモグリバエ類 | 2000 | 100～300L/10 | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |

次ページへ続く

前ページから続く

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 使用 液量 | 使用 時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用 方法 | クワントレリアプ ロール を含む農薬の 総使用回数 |
|--|--|--------------|---|--------------------|-----------------|----------------------|---|
| キャベツ | コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 カブラハバチ類 | 100倍 | セル成型育苗トレ イ1箱またはペー パーポット1冊(約 30×60cm、使用土 壌約1.5～4L)当り 0.5L | 育苗期後半 ～定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、 定植後の処理 は3回以内) |
| | コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバチ類 | 500倍 | 苗地床 1㎡当り2L | | | | |
| | コナガ類、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバチ類 オオタバコガ | 2000倍 20倍 | 100～300L/10a 1～2L/10a | 収穫前日 まで | 3回以内 | 散布 無人航空機 による散布 | |
| はくさい | コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 | 100 | セル成型育苗トレ イ1箱またはペー パーポット1冊(約 30×60cm、使用土 壌約1.5～4L)当り 0.5L | 育苗期 後半～ 定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理 は3回以内) |
| | コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 | 2000 20 | 100～300L/10a 1～2L/10 a | 収穫前日 まで | 3回以内 | 散布 無人航空機 による散布 | |
| 非結球あぶらな科 葉菜類 (タアサイ、 非結球はくさい、 ばな類を除く) | コナガ | 2000倍 | 100～300L/10 | 収穫前日 まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 非結球 はくさい | コナガ | 2000 | 100～300L/10a | 収穫前日 まで | 2回以内 | 灌注 | 3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以) |
| | ハスモンヨトウ | 100 | セル成型育苗ト レイ1箱または ペーパーポット1 冊(約30×60cm、 使用土壌約1.5～ 4L)当り0.5L | 育苗期後半 ～ 定植当日 | 1回 | 散布 | |
| 非結球 レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 ネキリムシ類 ヒメフタテンヨコバイ | 100 | セル成型育苗ト レイ1箱または ペーパーポット1 冊(約30×60cm、 使用土壌約1.5～ 4L)当り0.5L | 育苗期後半 ～ 定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の処 理は3回以内) |
| | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 | 2000 20 | 100～300L/10a 1～2L/10a | 収穫前日 まで | 3回以内 | 散布 無人航空機 による散布 | |

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上