

# ダブルカット<sup>®</sup>粉剤3DL

■種類名：カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤  
■有効成分：カスガマイシン塩酸塩 ----- 0.34%  
[カスガマイシンとして ----- 0.30%]  
トリシクラゾール ----- 0.50%

■登録番号：第22480号  
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)  
■登録初年：2009.10.07  
■性状：類白色粉末 45µm以下、  
浮遊性指数 20以下  
■有効年限：5年  
■包装：3kg×8袋

## 【特長】

- いもち病菌の菌糸伸長を抑制するカスガマイシンと、稲への侵入阻止、二次感染阻止作用を有するトリシクラゾールの混合剤。
- 散布適期幅が広く、耐雨性にすぐれる。
- いもち病の他にも、もみ枯細菌病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、内穎褐変病にも効果を有する。

## 【適用内容】(2023年10月末日現在)

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 内穎褐変病	3~4 kg/10a	穂揃期まで	2回以内	散布	4回以内 (種子浸漬は1回以内、 育苗箱への処理は1回以 内、本田では2回以内)	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、本田では 3回以内)

## 【効果・薬害等の注意】

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布すること。
- 本剤によるもみ枯細菌病の防除はいもち病との同時防除として穂ばらみ期~穂揃期に使用すること。
- れんこんには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布すること。
- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。