

ダブルカットトレボン粉剤DL

■種類名：エトフェンプロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤	
■有効成分：エトフェンプロックス	0.50%
カスガマイシン塩酸塩	0.11%
[カスガマイシンとして]	0.10%
トリシクラゾール	0.50%

■登録番号：第22490号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：2009.10.21
■性状：類白色粉末 45 μm以下 浮遊性指数 20以下
■有効年限：5年
■包装：3kg×8袋

【特長】

- いもち病防除剤ダブルカットと殺虫剤トレボンとの混合剤。
- ダブルカットは、いもち病菌の稲への侵入や病斑形成阻止に加えて、二次感染阻止作用を有することで、優れた残効性を示す。
- トレボンにより、水稻の主要害虫に有効で、速効性と残効性に優れる。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ	3~4 kg/10a	穂揃期 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 (種子浸漬は1回 以内、育苗箱へ の処理は1回 以内、本田では 2回以内)	4回以内 (育苗箱への処 理は1回以内、 本田では 3回以内)

【効果・薬害等の注意】

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の製剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布すること。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- れんこんには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池等周辺での使用はさけること。
散布後は水管理に注意すること。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。