

お客様各位

2024年10月30日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2024年10月30日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第22513号 ワイドパワー粒剤

変更の内容

- ・移植水稻の使用時期「移植後20日～ノビエ5葉期 但し、収穫60日前まで」を「移植後20日～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- ・直播水稻の使用時期「稲4葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで」を「稲4葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- ・適用雑草名「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更する。
- ・適用雑草名「ヘラオモダカ（東北）」を「ヘラオモダカ」に変更する。
- ・適用雑草名「クログワイ（関東・東山・東海を除く）」を「クログワイ」に変更する。
- ・適用雑草名「シズイ（東北、関東・東山・東海）」を「シズイ」に変更する。
- ・適用表中、適用土壌、適用地帯の欄を削除する。

【変更後の適用内容】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ヘキサラムを含む農薬の総使用回数	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ ヒルムシロ シズイ	移植後 20日～ ノビエ 5葉期 但し、 収穫45日前 まで	3kg/10a	1回	落水散布 又は ごく浅く 湛水して 散布	2回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲4葉期～ ノビエ 4葉期 但し、 収穫45日前 まで					

次のページへ続く

前のページから続く

【注意事項の追加・変更】

- ・本剤を移植水稻に使用する場合は、ノビエの5葉期までに時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは5葉期まで、オモダカは矢じり葉抽出期まで、クログワイ、シズイは草丈20cm以下、ヒルムシロは生育期までが本剤の散布適期である。
- ・本剤の使用後に低温が続くと予想される場合には、稲に生育抑制などの薬害が発生するおそれがあるので、使用をさけること。

製品情報の詳細は、[こちら\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照ください。

以上