

お客様各位

2022年12月7日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
此の度、2022年12月7日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第22636号 ダブルカットトレボンフロアブル

### 適用拡大の内容

- 使用方法「散布」、希釈倍数「300倍」の適用病害虫名に、「内穎褐変病」、「もみ枯細菌病」、「コブノメイガ」を追加する。
- 使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更し、適用病害虫名に「内穎褐変病」、「もみ枯細菌病」、「コブノメイガ」を追加する。
- 使用方法「空中散布」、希釈倍数「8倍」の適用病害虫名に「内穎褐変病」、「もみ枯細菌病」、「コブノメイガ」を追加する。
- 使用方法「空中散布」、希釈倍数「30倍」の適用病害虫名に「内穎褐変病」、「もみ枯細菌病」、「ツマグロヨコバイ」、「コブノメイガ」を追加する。

### 【変更後の適用内容(追加・変更する作物のみ抜粋)】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	1000倍	60~200 L/10a	穂揃期まで	2回以内	散布
		300倍	25 L/10a			無人航空機による散布
		8倍	800ml/10a			空中散布
		8倍	800ml/10a			
		30倍	3L/10a			

エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
3回以内	4回以内 (種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内、本田では2回以内)	4回以内 (育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内)

次ページへ続く

前ページから続く

【変更後の注意事項（修正部分）】

- ・ ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
- ・ 杉（特に苗木）、れんこん及び大豆には薬害を生じるおそれがあるのでかからないように注意して散布すること
- ・ 野菜類の幼苗及びなし（二十世紀、幸水、新水等）には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- ・ 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。
  - ① 各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
  - ② 散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
  - ③ 散布中、薬液の漏れの無いように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
  - ④ 散布液薬の飛散によって自動車やカートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
  - ⑤ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意すること。
  - ⑥ 作業終了後は次の項目を守ること。
    - a 使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄すること。
    - b 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄液は安全な場所に処理すること。

製品情報の詳細は、[こちら\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上