

# ダブルカット<sup>®</sup>K粉剤DL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ■種類名：エチプロール・カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤 |       |
| ■有効成分：エチプロール                   | 0.50% |
| カスガマイシンー塩酸塩                    | 0.11% |
| [カスガマイシンとして                    | 0.10% |
| トリシクラゾール                       | 0.50% |

|                                |
|--------------------------------|
| ■登録番号：第22887号                  |
| ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)   |
| ■登録初年：2011.03.02               |
| ■性状：類白色粉末 45μm以下、<br>浮遊性指数20以下 |
| ■有効年限：5年                       |
| ■包装：3kg×8袋                     |

## 【特長】

- いもち病防除剤ダブルカットと殺虫剤キラップとの混合粉剤。
- エチプロールがカメムシ類に対して安定した防除効果を発揮する。

## 【適用内容】(2021年1月末日現在)

| 作物名 | 適用病害虫名                | 使用量           | 使用時期      | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エチプロールを含む農薬の総使用回数                            | カスガマイシンを含む農薬の総使用回数  | トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数                     |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|---------|------|--|---|---|
| 稲   | いもち病<br>カメムシ類<br>ウンカ類 | 3～4<br>kg/10a | 穂揃期<br>まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内<br>(は種時(直播)<br>又は移植時<br>までの処理は<br>1回以内) | 4回以内<br>(種子浸漬は1回<br>以内、育苗箱への<br>処理は1回以内、<br>本田では2回<br>以内) | 4回以内<br>(育苗箱への処理は<br>1回以内、本田では<br>3回以内) |

## 【効果・薬害等の注意】

- 本剤は飛散を少なくするように製剤化されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ◆ ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
  - ◆ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- れんこんには薬害を生ずるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布すること。
- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には、薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。