

お客様各位

2021年9月8日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2021年9月8日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第22902号 ホクコーザクサ液剤

### 適用拡大の内容

- ・ 作物名「いちご」、「にら」、「にんにく」を追加する。
- ・ 作物名「果樹類(かんきつ、りんご、びわ、いちよう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く)」、「かんきつ」、「りんご」、「びわ」、「キウイフルーツ」、「くり」、「いちよう(種子)」、「さんしょう(果実)」、「アスパラガス」、「水田作物」、「水田作物(水田刈跡)」、「水田作物(水田畦畔)」、「花き類・観葉植物」、「樹木類」及び「樹木等」の使用時期の草丈に関する記載を削除し、【追加・変更後】のとおりとする。

### 【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルホネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
いちご	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	300~500 mL/10a		3回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
にら	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)			2回以内		3回以内
にんにく	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)			2回以内		2回以内
果樹類 (かんきつ、りんご、 びわ、いちよう(種 子)、くり、キウイフ ルーツ、食用桑(果実)、さん しょう(果実)を除く)	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)			500~1000 mL/10a		100~ 150L/10a
かんきつ りんご びわ キウイフルーツ	—	多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a				
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
くり	—	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a				
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
いちよう (種子)	—	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a				
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				

次ページに続く

前ページから続く

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルホネット及びツベルホネットPを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
さんしょう (果実)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	2回以内		2回以内				
		多年生雑草		500~1000 mL/10a								
アスパラガス		一年生雑草	萌芽前 (雑草生育期)	300~500 mL/10a					2回以内		2回以内	
			収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)									
水田作物		一年生雑草	収穫打切り後 (雑草生育期)	500mL/10a					1回		1回	
			耕起前 (雑草生育期)	300~500 mL/10a								
水田作物 (水田刈跡)		水田 刈跡	雑草生育期									
水田作物 (水田畦畔)		水田 畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)					500~1000 mL/10a	2回以内	2回以内	
花き類・ 観葉植物		—	一年生雑草	雑草生育期 畦間処理					300~500 mL/10a			3回以内
樹木類				雑草生育期					300~500 mL/10a			
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車 場 道路 運動 場 宅地 のり 面 鉄 道等	一年生雑草	雑草生育期	500~1000 mL/10a	100~200 L/10a	3回以内	植栽 地を 除く 樹木 等の 周辺 地に 雑草 茎葉 散布	3回以内				
		多年生雑草		1000~ 2000mL/10a								

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上