

お客様各位

2026年1月21日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2026年1月21日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第22902号 ホクヨーザクサ液剤

適用拡大の内容

- 作物名「そば」、「豆類（種実）」、「豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）」、「えだまめ」、「さといも」「さといも（葉柄）」、「かんしょ」、「ごぼう」、「いちご」、「ピーマン」、「なす」、「トマト」、「ミニトマト」、「きゅうり」、「とうがらし類」、「メロン」、「レタス」、「非結球レタス」、「はくさい」、「キャベツ」、「たまねぎ」、「にんにく」、「ねぎ」、「すいか」、「ブロッコリー」、「にんじん」、「ほうれんそう」、「ごま」、「かのこそう」及び「甘草」の使用時期に「耕起前」を追加する。
- 作物名「豆類（種実）」、「豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）」、「えだまめ」及び「はくさい」の使用時期における記載「は種」を「は種前」に変更する。
- 作物名「ばれいしょ」及び「やまいも」の使用時期に「耕起前・植付前」を追加する。
- 作物名「だいこん」、「とうがん」及び「ぎぼうし」の使用時期に「耕起前・は種前」を追加する。
- 作物名「にら」、「しそ」の使用時期に「耕起前・は種前・定植前」を追加する。

(次のページに続く)

(前のページから続く)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネット及びグルホシネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
そば	一年生雑草		耕起前・は種前 (雑草生育期)	300～ 500 ml/10a	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
豆類 (種実)			収穫 28 日前まで (雑草生育期) 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)					
豆類 (未成熟 、ただし、 えだまめを 除く)			収穫前日まで (雑草生育期) 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)					
えだまめ			収穫 14 日前まで (雑草生育期) 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)					
ばれいしょ			収穫 14 日前まで (雑草生育期) 株間処理 (本葉 5 葉期以降))				1回	3回以内 (萌芽前は 1回以内、 萌芽後は 2回以内)
さといも			雑草生育期 耕起前・植付前 又は萌芽前処理					
さといも (葉柄)			収穫 21 日前まで (雑草生育期 畦間処理)	100～ 150 ミリリットル /10a	2回以内	3回以内	3回以内	3回以内
かんしょ			収穫 30 日前まで (雑草生育期 耕起前・植付前 又は畦間処理)					
ごぼう			収穫 7 日前まで (雑草生育期 耕起前・植付前 又は畦間処理)					
だいこん			収穫 30 日前まで (雑草生育期 耕起前・植付前 又は畦間処理)	300～ 500 ml /10a	2回以内	3回以内	2回以内	2回以内
やまのいも			収穫前日まで (雑草生育期 耕起前・は種前 又は畦間処理)					
			収穫 45 日前まで (雑草生育期 耕起前・は種前 又は畦間処理)					
			収穫 30 日前まで (雑草生育期 耕起前・植付前・萌芽前 又は畦間処理)					

(次のページに続く)

(前のページから続く)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グアルホシネット及びグアルホシネットPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
いちご、 ピーマン、 なす、トマト、 ミニトマト、 きゅうり、 とうがらし類	一年生 雑草		収穫前日まで (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)	300～ 500 mL /10a	100～ 150 リットル /10a	3回以内	3回以内	2回以内	
メロン、 レタス、 非結球レタス			収穫 30 日前まで (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)						
はくさい			収穫 45 日前まで (雑草生育期 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)						
キャベツ			収穫 45 日前まで (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)						
たまねぎ			収穫 7 日前まで (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)						
にんにく			収穫前日まで (雑草生育期 耕起前・萌芽前 又は畦間処理)				雑草 茎葉 散布		
にら			収穫前日まで (雑草生育期 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)						
ねぎ、すいか、 プロッコリー			収穫前日まで (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)						
にんじん			収穫 7 日前まで (雑草生育期 耕起前・は種前 又は畦間処理)			3回以内	3回以内		
ほうれんそう			耕起前・は種前 又は定植前 (雑草生育期)			2回以内			
とうがん			収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)			3回以内	3回以内		
しそ			収穫 14 日前まで (雑草生育期 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)			2回以内			

(次のページに続く)

(前のページから続く)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グアルホシネット及び グアルホシネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ごま	—	一年生雑草	耕起前・は種又は定植9日前まで(雑草生育期)	500 mL /10a	100 リットル /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内(は種又は定植後は2回以内)
			収穫21日前まで(雑草生育期畠間処理)			2回以内		
ぎぼうし			収穫90日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畠間処理)	300～500 mL /10a	100～150 リットル /10a	3回以内		3回以内
かのこそう			収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畠間処理)			2回以内		2回以内
甘草						9回以内(1年間に3回以内)		9回以内(1年間に3回以内)

製品情報の詳細は、[こちら\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#)からご参照ください。

以上