

お客様各位

2018年4月26日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2018年4月25日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第22908号 ホクコーダイロンゾル

### 適用変更の内容

以下の事項を追加、変更し、【変更後】のとおりとする。

- 1) 作物名「さとうきび(春植又は夏植)」の使用時期「植付覆土後又は培土後(雑草発生前)」の薬量「160～200ml/10a」を「160～240ml/10a」に変更する。
- 2) 作物名「飼料用さとうきび(春植又は夏植)」の使用時期「植付覆土後又は培土後(雑草発生前)」の薬量「160～200ml/10a」を「160～240ml/10a」に変更する。
- 3) 作物名「かんきつ」を追加する。
- 4) 作物名「樹木等」の「ゼニゴケ」を「コケ類」に変更する。
- 5) 適用地帯の欄を削除する。

### 【変更後】

| 作物名   | 適用場所 | 適用<br>雑草名 | 使用時期  | 使用量                   |              | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用方法                   | DCMUを含む<br>農薬の<br>総使用回数                 |
|-------|------|-----------|---|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|---|
|       |      |           |   | 薬量                    | 希釈<br>水量     |                     |                        |   |
| ばれいしょ | —    | 一年生<br>雑草 | 植付後萌芽前<br>(雑草発生前<br>～始期)                          | 100～<br>200<br>ml/10a | 100<br>L/10a | 1回                  | 土壌散布                   | 1回                                      |
| やまのいも |      |           | 植付後萌芽前<br>(雑草発生前～始期(イ<br>ネ科雑草3葉期まで))              |                       |              |                     | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 | 2回以内<br>(萌芽前は<br>1回以内、<br>生育期は<br>1回以内) |
|       |      |           | 生育期(畦間処理:雑<br>草生育期(草丈15cm以<br>下))ただし、収穫60日<br>前まで |                       |              |                     |                        |   |

| 作物名  | 適用場所            | 適用<br>雑草名   | 使用時期                     | 使用量                       |                        | 本剤<br>の<br>使用<br>回数   | 使用方法                   | DCMU を含む<br>農薬の<br>総使用回数                   |
|--|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|  |                 |   |                          | 薬量                        | 希釈<br>水量               |                       |                        |  |
| だいず  | —               | 一年生<br>雑草   | は種後出芽前<br>(雑草発生前)        | 150～<br>200<br>ml/10a     | 100<br>L/10a           | 1 回                   | 土壌散布                   | 2 回以内<br>(出芽前は<br>1 回以内、<br>生育期は<br>1 回以内) |
|  |                 |   | は種後出芽前<br>(雑草発生始期)       | 100～<br>200<br>ml/10a     |                        |                       | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 |  |
| 生育期(畦間・株間処<br>理:本葉5葉期以降、<br>雑草生育期(草丈15cm<br>以下)ただし、収穫30<br>日前まで) |                 |   |                          |                           |                        |                       |                        |  |
| は種後出芽前<br>(雑草発生前)  |                 |   | 150～<br>200<br>ml/10a    | 土壌散布                      |                        |                       |                        |  |
| あずき  |                 | 生育期<br>(畦間処理:雑草生育期<br>(草丈15cm以下)た<br>だし、収穫30日前まで) | 100～<br>200<br>ml/10a    | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布    |                        |                       |                        |  |
|  |                 |   | 一年生<br>雑草<br>多年生<br>広葉雑草 | 植付覆土後<br>又は培土後<br>(雑草発生前) |                        | 160～<br>240<br>ml/10a | 土壌散布                   |  |
| 植付覆土後<br>又は培土後<br>(雑草発生始期)                                       |                 | 100～  |                          | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布    |                        |                       |                        |  |
| 生育期<br>(雑草生育期(草丈15cm<br>以下)ただし、収穫60<br>日前まで)                     |                 | 150<br>ml/10a                                     |                          |                           |                        | 2 回<br>以内             |                        |  |
| さとうきび<br>(春植又は夏<br>植)  | 萌芽前<br>(雑草発生前)  | 160～<br>200<br>ml/10a                             |                          | 土壌散布                      |                        |                       |                        |  |
| さとうきび<br>(株出)  | 萌芽前<br>(雑草発生始期) | 100～<br>150<br>ml/10a                             | 1 回                      |                           | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 |                       |                        |  |

| 作物名                          | 適用場所 | 適用<br>雑草名                | 使用時期  | 使用量                       |              | 本剤<br>の<br>使用<br>回数      | 使用方法                   | DCMUを含む<br>農薬の<br>総使用回数 |                        |                        |
|------------------------------|------|--------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |      |                          |   | 薬量                        | 希釈<br>水量     |                          |                        |                         |                        |                        |
| さとうきび<br>(株出)                | —    | 一年生<br>雑草<br>多年生<br>広葉雑草 | 生育期<br>(雑草生育期(草丈15cm<br>以下)ただし、収穫60<br>日前まで | 100～<br>150<br>ml/10a     | 100<br>L/10a | 2回<br>以内                 | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 | 2回以内<br>(土壌散布は<br>1回以内) |                        |                        |
| 飼料用さとう<br>きび<br>(春植又は夏<br>植) |      |                          | 植付覆土後<br>又は培土後<br>(雑草発生前)                   | 160～<br>240<br>ml/10a     |              |                          |                        |                         | 1回                     | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 |
|                              |      |                          | 植付覆土後<br>又は培土後<br>(雑草発生前)                   | 100～<br>150<br>ml/10a     |              |                          |                        |                         |                        |                        |
|                              |      |                          | 生育期<br>(雑草生育期(草丈15cm<br>以下)ただし、収穫75<br>日前まで | 100～<br>150<br>ml/10a     |              |                          |                        |                         |                        |                        |
| 飼料用さとう<br>きび<br>(株出)         |      |                          | 萌芽前<br>(雑草発生前)                              | 160～<br>200<br>ml/10a     |              | 1回                       | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 | 1回                      |                        |                        |
|                              |      |                          | 萌芽前<br>(雑草発生前)                              | 100～<br>150<br>ml/10a     |              |                          |                        |                         |                        |                        |
|                              |      |                          | 生育期<br>(雑草生育期(草丈15cm<br>以下)ただし、収穫75<br>日前まで | 100～<br>150<br>ml/10a     |              |                          |                        |                         |                        |                        |
| かんきつ                         |      |                          | 一年生<br>雑草                                   | 雑草発生前<br>ただし、<br>収穫60日前まで |              | 200～<br>400<br>ml/10a    | 100<br>L/10a           | 1回                      | 雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 | 1回                     |
| パイナップル                       |      |                          |   | 植付直後<br>(雑草発生前)           |              | 150～<br>200<br>ml/10a    | 100～<br>200<br>L/10a   |                         |                        |                        |
| 水田作物<br>(水田畦畔)               |      |                          |   | 水田畦畔                      |              | 雑草発生前～生育初<br>期(草丈15cm以下) | 200～<br>250<br>ml/10a  |                         |                        |                        |

| 作物名 | 適用場所  | 適用<br>雑草名 | 使用時期                         | 使用量                     |                      | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用方法   | DCMUを含む<br>農薬の<br>総使用回数 |
|-----|---|-----------|------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|
|     |   |           |                              | 薬量                      | 希釈<br>水量             |                     |  |                         |
| 樹木等 | 公園、庭園、<br>堤とう、駐車場、道<br>路、運動場、宅地、<br>のり面、<br>鉄道等 | コケ類       | コケ類生育期                       | 500～<br>1000<br>ml/10a  | 100～<br>200<br>L/10a | 3回<br>以内            | 植栽地を除く<br>樹木等の<br>周辺地に<br>雑草茎葉散布<br>又は全面土壌<br>散布 | 3回以内                    |
|     |   | 一年生<br>雑草 | 雑草発生前～生育初<br>期(草丈20cm<br>以下) | 1000～<br>2000<br>ml/10a | 100<br>L/10a         |                     |  |                         |

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上