

お客様各位

2024年5月15日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2024年5月15日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第2300号 ホクコーマラソン乳剤

### 適用変更の内容

- ・ 作物名「だいず」、「あずき」および「えんどうまめ」の適用病害虫名「ハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・ 作物名「いんげんまめ」の適用病害虫名「ハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に、「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・ 作物名「だいこん」、「かぶ」、「はくさい」、「キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「きゅうり」、「メロン」、「うり類（漬物用）」、「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・ 作物名「豆類（未成熟）」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に、「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・ 作物名「かんきつ（なつみかんを除く）」、「りんご」、「なし」、「もも」、「うめ」、「おうとう」、「ぶどう」および「かき」の希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更する。
- ・ 作物名「びわ」に適用病害虫名「ビワキジラミ」を追加する。

(次のページに続く)

【変更後の適用内容】（追加・変更された作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	馬拉ソンを含む農薬の総使用回数
だいず あずき えんどうまめ	ハモグリバエ類 マメシンクイガ	1000 倍	100～300 ㍲/10a	収穫7日 前まで	3回 以内	散布	3回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
いんげんまめ	ハモグリバエ類 マメシンクイガ	1000 倍					
	インゲンテントウ	1000～ 2000 倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
だいこん	アオムシ カブラハバチ ナモグリバエ	1000 倍					
	アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
かぶ	アオムシ カブラハバチ ナモグリバエ	1000 倍		4回 以内	4回以内		
	アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
はくさい キャベツ	アオムシ カブラハバチ	1000 倍		収穫前日 まで	5回 以内		5回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
カリフラワー ブロッコリー	アオムシ カブラハバチ	1000 倍		収穫3日 前まで	5回 以内		5回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
たまねぎ	ハモグリバエ類	1000 倍		収穫7日 前まで	6回 以内		6回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
ねぎ	ネギモグリバエ	1000 倍		6回 以内	6回以内		
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
きゅうり メロン うり類(漬物用)	ウリハムシ	1000 倍	収穫前日 まで	3回 以内	3回以内		
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
かぼちゃ	ウリハムシ	1000 倍	5回 以内	5回以内			
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
すいか	ウリハムシ	1000 倍	6回 以内	6回以内			
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					

(次のページに続く)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数
豆類(未成熟)	カメムシ類 ハモグリバエ類 マメシクイガ	1000 倍	100～300 リットル/10a	収穫7日 前まで	3回 以内		3回以内
	インゲンテントウ	1000～ 2000 倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
かんきつ (なつみかんを 除く)	カイガラムシ類 ハマキムシ類 アオバハゴロモ ヤノネカイガラムシ 若齢幼虫	1000～ 2000 倍	200～700 リットル/10a	収穫14日 前まで	5回 以内	散布	5回以内
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					5回以内 (休眠期から 芽出直後までは 1回以内)
りんご	モモシクイガ	1000 倍	200～700 リットル/10a	収穫7日 前まで	5回 以内	散布	5回以内 (休眠期から 芽出直後までは 1回以内)
	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000 倍					5回以内 (休眠期は 1回以内)
	アブラムシ類 ハダニ類 リンゴワタムシ	1000～ 3000 倍					
なし	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000 倍	200～700 リットル/10a	収穫7日 前まで	5回 以内	散布	5回以内 (休眠期は 1回以内)
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					5回以内
もも	モモシクイガ	1000 倍	200～700 リットル/10a	収穫7日 前まで	5回 以内	散布	5回以内
	カイガラムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000 倍					
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
うめ	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000 倍	200～700 リットル/10a	収穫7日 前まで	5回 以内	散布	5回以内 (休眠期の 50倍希釈 散布は 1回以内)
	アブラムシ類	1000～ 3000 倍					
おうとう	ハマキムシ類	1000～ 2000 倍	200～700 リットル/10a	収穫7日 前まで	5回 以内	散布	5回以内 (休眠期の 50倍希釈 散布は 1回以内)
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					
ぶどう	キンケクチブトゾウ ムシ成虫	1000 倍	200～700 リットル/10a	収穫7日 前まで	6回 以内	散布	6回以内
	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000 倍					
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000 倍					

(次のページに続く)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	馬拉ソンを含む農薬の総使用回数
かき	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000倍	200～700 リットル/10a	収穫30日 前まで	4回 以内	散布	4回以内
	イラガ類	1000～ 3000倍					
びわ	<u>ビワキジラミ</u>	2000倍		収穫7日 前まで	5回 以内		5回以内
	アブラムシ類	2000～ 3000倍					

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照ください。

以上