

# スターダム<sup>®</sup>箱粒剤

■種類名：ジノテフラン粒剤

■有効成分：ジノテフラン----- 12.0%

■登録番号：第23075号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2012.04.25

■性状：類白色細粒

■有効年限：5年

■包装：1kg×12袋

## 【特長】

- 育苗箱処理で斑点米カメムシまで防除できる新型省力剤。
- 水稻初期害虫であるイネミズゾウムシ、イネドロオイムシからウンカ類、斑点米カメムシまで長期にわたって効果を示す。

## 【適用内容】(2018年5月16日現在)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	カメムシ類	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5%) 1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	ウンカ類 イナゴ類 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネカラバエ フタオビコヤガ ニカメイチュウ		移植3日前～ 移植当日			

## 【効果・薬害等の注意】

- 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水してから田植機にかけて移植すること。
- 処理苗の移植後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 葉先枯れなどの薬害を生じることもあるので、散布ムラがないよう均一に散布すること。
- 容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。