

ホクコーフルーツセイバー®

■種類名：ペンチオピラド水和剤
 ■有効成分：ペンチオピラド ----- 15.0%

■登録番号：第23134号
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 ■登録初年：2012.10.10
 ■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
 ■有効年限：3年
 ■包装：250ml×20本、334ml×20本

【特長】

- 病害防除スペクトラムが広く、優れた予防効果を示す。
- 既存薬剤耐性菌（ジカルボキシイミド剤、EBI 剤などに耐性を示す灰色かび病菌、黒星病菌）にも優れた効果を示す。
- 適用作物の多くで収穫前日まで使用可能。
- フロアブル製剤なので汚れが少ない。

【適用内容】（2018年7月25日現在）

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数
おうとう	灰星病 幼果菌核病 炭疽病 褐色せん孔病	1500倍	200~700 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病	1500~3000倍					
	褐色斑点病	2000倍					
ぶどう	灰色かび病 黒とう病 晩腐病 さび病 うどんこ病 褐斑病	1500倍		収穫7日前まで			
もも	うどんこ病 黒星病 灰星病 果実赤点病	1500~2000倍		収穫前日まで			
ネクタリン	うどんこ病	2000倍					
小粒核果類	黒星病 灰星病	1500~2000倍 1500倍					
りんご	黒点病 斑点落葉病	1500~2000倍					
	黒星病 モニリア病 すす点病 すす斑病 赤星病 うどんこ病	1500~3000倍					
	褐斑病 灰色かび病	2000倍					
	かんきつ	灰色かび病 そうか病	1500~2000倍				
かき	黒点病 炭疽病	1500倍					
	灰色かび病 うどんこ病 落葉病	1500~2000倍					
	すす点病	2000倍					

【効果・薬害等の注意】

- 使用前によく振ってから使用すること。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。

- ぶどうの幼果期（小豆大）以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用を避けること。
- 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。