

カチボシ® L ジャンボ

■種類名：イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤
 ■有効成分：イプフェンカルバゾン-----8.3%
 テフリルトリオン-----6.7%
 ベンスルフロンメチル-----1.7%
 ■PRTR指定物質：ドデシル硫酸ナトリウム [第1種] -----1.2%

■登録番号：第23516号
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 ■登録初年：2014.09.10
 ■性状：淡褐色細粒 水溶性パック
 1パック30g
 ■有効年限：3年
 ■包装：300g×20袋、900g×12袋

【特長】

- 新規有効成分イプフェンカルバゾンがノビエの発生を長期間抑える。
- SU抵抗性ホタルイ、コナギ、アゼナ類等に高い効果を示す。
- ウリカワ、ミズガヤツリ等に高い効果を示す。

【適用内容】(2015年5月27日現在)

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 |
|------|---|---|----------------|--|---------|---------------------|--|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ クログワイ(九州を除く) オモダカ(九州を除く) ヒルムシロ、セリ | 移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで | 砂壤土 ～ 埴土 | 小包装 (パック) 10 個 (300g) /10a | 1 回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる | 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国、 九州の普通期及び 早期栽培地帯 |
| | | 移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで | 壤土 ～ 砂壤土 | | | | 北陸 |
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ ヒルムシロ、セリ | 稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前まで | 壤土 ～ 埴土 | | | | 全域 |

| イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数 | テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |

【効果・薬害等の注意】

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの 2.5 葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワは 2 葉期まで(ウリカワの北陸、関東・東山・東海は発生始期まで、ホタルイの直播水稲は 3 葉期まで)、クログワイ、オモダカは発生前から発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期までが本剤の散布適期である。オモダカ、クログワイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- 苗の植え付けが均一となるように代かきを丁寧に行うこと。未熟有機物を使用した場合は、特に丁寧に行うこと。
- 処理に当っては水の出入りを止めて水深 5～6cm の湛水状態にし、散布後少なくとも 3～4 日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させないようにし、散布後 7 日間は落水、かけ流しはしないこと。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じること。
- 本剤は小包装(パック)のまま 10 アール当たり 10 個の割合で水田に均等に投げ入れること。
- 藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり、効果の劣る可能性があるため使用を避けること。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することのないように注意すること。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用を避けること。
 - ◆ 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深 2cm/日以上)
 - ◆ 軟弱な苗を移植した水田
 - ◆ 極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田
- 本剤を直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件下では、薬害を生ずるおそれがあるので使用を避けること。
- 梅雨期等、散布後に多量の雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用を避けること。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には、十分注意すること。
- 散布田の水田水を他の作物に灌水しないこと。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常的使用方法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- ❖ 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
 - ① 誤食などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
 - ② 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
 - ③ 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
 - ④ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用すること。散布後は水管理に注意すること。
空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を堅く閉じて保管すること。また、強く加圧されると包装材フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにすること。