ジオゼット ®水和剤

■種 類 名：ポリオキシン水和剤
■有効成分：ポリオキシンD亜鉛塩---------- 2.25%
［ポリオキシンDとして ---------- 20,000PsDu/g］
■化管法指定物質：ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が9のものに限る。)
［第１種］ ---------- 3.0%

■登録番号：第23575号(科研製薬登録)
■毒　　性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
■登録初年：2014.10.22
■性　　状：淡褐色水和性粉末　63μm以下
■有効年限：6年
■包　　装：500g×20袋、1kg×20袋

【特長】

- リゾクトニア病害に優れた予防・治療効果を示す。
- 独自の作用性(キチン生合成阻害)を有し、既存薬剤耐性菌にも有効である。
- 微生物由来の天然物質成分であり、化学合成農薬でない。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝを含む農薬の総使用回数
キャベツ	株腐病	1000	100～300 ﾘｯﾄﾙ/10ａ	収穫１４日前まで	３回以内	散布	７回以内（種子浸漬は１回以内、1000 倍希釈灌注は１回以内、2500 倍希釈灌注は２回以内、散布は３回以内）
レタス 非結球レタス	すそ枯病						３回以内
	灰色かび病	500					
ねぎ	白絹病						
	黒斑病 さび病 葉枯病	1000					
きゅうり	うどんこ病 灰色かび病			収穫前日まで	２回以内		２回以内
アスパラガス	茎枯病 斑点病	500	100～400 ﾘｯﾄﾙ/10ａ	収穫前日まで	３回以内		３回以内
きく	立枯病		100～300 ﾘｯﾄﾙ/10ａ	発病初期	８回以内		８回以内

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに、衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。