

お客様各位

2017年4月17日
北興化学工業株式会社

農薬登録情報

2017年4月12日付で下記農薬の適用が変更登録されたので、ご連絡申し上げます。

記

農薬名

第23579号 ワイドショット1キロ粒剤

適用拡大の内容

- ・ 適用作物「直播水稻」の使用時期を「湛水直播の稲4葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで」から「稲4葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- ・ 移植水稻の適用雑草名に「シズイ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ オモダカ クログワイ <u>シズイ</u> ヒルムシロ セリ	移植後 15 日～ ノビエ4葉期 但し、収穫45日 前まで	1 kg/10a	1回	湛水散布又は 無人ヘリコプターに よる散布
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲4葉期～ ノビエ4葉期 但し、収穫45日 前まで			

- ・ 使用上の注意事項に下記（下線部）を追加する。
- (1) 本剤は、ノビエの4葉期までに時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によ

って効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは4葉期まで(直播水稻におけるウリカワは3葉期まで)、オモダカは草丈30cm以下、クログワイは草丈20cm以下、シズイは草丈20cm以下、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期までが本剤の散布適期である。

(2) オモダカ、クログワイ、シズイの防除は、必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせて使用すること。

適用拡大後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上