

# キマリテ<sup>®</sup>ジャンボ

- 種類名：イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン粒剤
- 有効成分：イブフェンカルバゾン-----8.3%  
                  テフリルトリオン-----10.0%
- PRTR指定物質：ドデシル硫酸ナトリウム〔第1種〕-----1.2%

- 登録番号：第23724号
- 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 登録初年：2015.10.28
- 性状：淡褐色細粒 水溶性パック入り  
          1パック30g
- 有効年限：3年
- 包装：300g×20袋、900g×12袋

## 【特長】

- 2種類の有効成分からなる水稲用一発処理除草剤。
- ノビエの発生を長期間抑え、幅広い草種に高い効果を示す。
- ホタルイ、コナギ、アゼナ類などのSU抵抗性雑草やイボクサ・クサネムなどの特殊雑草にも高い効果を示す。

## 【適用内容】(2015年10月末日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イブフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数	テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ	移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に 小包装 (パック)の まま投げ 入れる	2回以内	2回以内

## 【効果・薬害等の注意】

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきること。
- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヘラオモダカは2葉期まで、クログワイ、オモダカは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用すること。
- 苗の植付けが均一となるよう、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行うこと。未熟有機物を使用した場合は、特にていねいに行うこと。
- 本剤は小包装(パック)のまま10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れること。
- 散布に当たっては、水の出入りを止め、水深5～6cmの湛水状態に保ち、湛水状態のまま田面に均一に散布すること。散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、田面が露出しないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じること。
- 藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり、効果の劣る可能性があるため使用をさけること。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することのないように注意すること。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけること。
  - ◆ 砂質土壌及び漏水田(減水深2cm/日以上)
  - ◆ 軟弱な苗を移植した水田
  - ◆ 極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田
- 活着遅延を生じるような異常低温及び寡照条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけること。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には、十分注意すること。
- 散布田の水田水を他の作物に灌水しないこと。
- 著しい多雨条件では、除草効果が低下することがあるので使用をさけること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### 【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常的使用方法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- ❖ 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
  - ① 誤食などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
  - ② 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
  - ③ 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
  - ④ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
  - ⑤ 付着した場合には、直ちに身体を洗い流し、うがいをするともに衣服を交換すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用すること。散布後は水管理に注意すること。  
空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を堅く閉じて保管すること。また、強く加圧されると包装材フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにすること。