

お客様各位

2019年7月11日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2019年7月10日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第23761号 **デズレートAZ粒剤** (登録会社 日本カーリット株式会社)

適用変更の内容

- 1) 作物名「水稻（水稻刈取跡）」の適用場所を「水稻刈取跡」、適用雑草木名を「一年生雑草及び多年生イネ科雑草」に変更し、適用雑草木名「セリ、オモダカ」を追加する。
- 2) 作物名「開墾後に栽培する農作物等」の本剤の使用回数の「2回以内」を「1」にする。
- 3) 作物名「水稻（水稻刈取跡）」の本剤の使用回数の「1回」を「1」にする。
- 4) 作物名「すぎ」及び「ひのき」の塩素酸塩を含む農薬の総使用回数の「3回以内」を「3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には、雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布及び株処理は合計1回以内)」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用場所	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
開墾後に栽培する農作物等	開墾地	一年生及び多年生雑草	雑草生育期(積雪時及び土壤凍結時を除く)	15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布	-
						空中散布	
まつからまつ えぞまつ とどまつ	地ごしらえ	雑かん木 ササ	雑草生育期(積雪時及び土壤凍結時を除く)	15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布	3回以内
	下刈り	ササ		10~20kg/10a		空中散布	
	地ごしらえ 又は下刈り	ササ	雑草生育期(草丈20cm以下)	30g/株径20cm, 60g/株径30cm, 85g/株径40cm,	1回	株処理	
						空中散布	
ぶな かんば	地ごしらえ	一年生及び多年生雑草	雑草生育期(積雪時及び土壤凍結時を除く)	15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布	3回以内
						空中散布	
	下刈り	雑かん木 ササ	雑草生育期(積雪時及び土壤凍結時を除く)	10~20kg/10a	2回以内	全面均一散布	
						空中散布	

次頁へ続く

作物名	適用場所	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
すぎひのき	地ごしらえ	一年生及び多年生雑草 雑かん木 竹類 スサキ	雑草生育期 (積雪時及び土壌凍結時を除く)	15～25kg/10a	2回以内	全面均一散布	3回以内 (全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布、全面均一散布、空中散布及び株処理は合計1回以内)
	下刈り			10～20kg/10a		空中散布	
	地ごしらえ又は下刈り	スサキ	雑草生育期 (草丈20cm以下)	30g/株径20cm, 60g/株径30cm, 85g/株径40cm,	1回	株処理	
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等	一年生及び多年生雑草	雑草生育 初期～中期	15～25kg/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	
		竹類	生育期	45～60kg/10a	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	
水稲 (水稲刈取跡)	水稲刈取跡	一年生雑草及び多年生イネ科雑草	水稲刈取後 (秋期雑草生育期)	20～25kg/10a	—	水稲刈取跡に全面土壌散布	—
		刈		20～40kg/10a			
		残がら		30～40kg/10a			

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上