

お客様各位

2018年8月29日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2018年8月29日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第23769号 キマリテ1キロ粒剤

### 適用変更の内容

- ・ 作物名に「直播水稻」を追加する。
- ・ 作物名「移植水稻」の使用方法「湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布」を「湛水散布又は無人航空機による散布」に変更する。

### 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数	テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ	移植時	1 kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用	2回以内	2回以内
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日 まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布		
直播水稻	水田一年生雑草 及び ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ 2.5葉期 但し、 収穫90日 前まで					

## 効果薬害に関する注意事項の変更及び追加

### 【変更】

(変更前)

- (1) 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヘラオモダカは2葉期まで、クログワイ、オモダカは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期である。
- (7) 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ること。

(変更後)

- (1) 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期まで(直播水稻は2.5葉期まで)に時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヘラオモダカは2葉期まで、クログワイ、オモダカは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期である。
- (8) 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。

### 【追加】

- (6) 稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。

## 安全使用上の注意事項の変更

(変更前)

- (2) 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

(変更後)

- (2) 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\)](#) からご参照下さい。

以上