# <sup>ホクコー</sup>エクシード<sup>™</sup>フロアブル

■種 類 名:スルホキサフロル水和剤

■有効成分:スルホキサフロル------------ 20.0% ■登録番号:第24021号

■毒 **1生**: 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

■登録初年:2017.12.25

■性 状:淡褐色水和性粘稠懸濁液体

■有効年限:3年 装:500ml×20本

■包

## 【特長】

新規系統の「スルホキシイミン系」殺虫剤。

稲の斑点米カメムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示す。

### 【適用内容】(2018年1月末日現在)

ECCUSION CONTRACTOR OF THE CON								
作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	スルホキサフロル を含む農薬の 総使用回数	
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	2000 倍	60~150 <b>l</b> /10a	収穫7日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	

## 【効果・薬害等の注意】

● 使用前に容器をよく振ってから使用すること。

- 本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布すること。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉へかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ◆ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
  - ◆関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場 合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 散布器具及び容器の洗浄水等は河川等に流さないこと。また、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等 関係機関の指導を受けることが望ましい。

#### 【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをすること。
- ❖ 保管:直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。